



Evaluación y tratamiento del EPOC agudizado.

Pedro Parra Hidalgo

Subdirector General de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación.

Servicio Murciano de Salud

- Un **10,2%** de la población española de 40-80 años padecen EPOC(EPI-SCAN).
 - ❖ 15,1% hombres.
 - ❖ 5,7% mujeres.

Con un **infra-diagnóstico del 73%**.

- En la Región de Murcia se estima que padecen EPOC **60.000 personas**:
 - ❖ 16.200 diagnosticadas.
 - ❖ 43.800 no diagnosticadas.

EPOC EN LA REGIÓN DE MURCIA

HOSPITALES

❖ Ingresos hospitalarios:

1.800 (1.600 hombres y 200 mujeres).

❖ Reingresos a los 30 días: 8,5% (5.2% - 11,7%).

❖ Estancia media: 12,5 días (6,4% - 23,2%).

❖ Estancias totales: 22.000

❖ Mortalidad intrahospitalaria: 5,5% (3,0% - 11,3%).

Fase I – EPOC ESTABLE

- ❖ En **2015** se creó un **grupo de trabajo** con participación de SOMUPAR y SMUMFYC, compuesto por médicos de familia, neumólogos, personal de enfermería y expertos en calidad.

Neumólogos (por orden alfabético)

Juan Luis de la Torre Álvaro

Hospital General Universitario Santa Lucía. Área II.

Beatriz Fernández Suarez

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Área I.

José Javier Martínez Garcerán

Hospital General Universitario Santa Lucía. Área II.

Pedro Méndez Martínez

Hospital General Universitario Reina Sofía. Área VII.

José Antonio Ros Lucas

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Área I.

Médicos de Familia (por orden alfabético)

Juan Vicente Alfaro González

CS Murcia Centro. Área VI.

Luis García-Giralda Ruiz

CS Murcia Centro. Área VI.

Josefina Marín López

Servicio Dirección de Programas y Coordinación Asistencial .

Gonzalo Ramón Sanz Mateo

Coordinador Médico de Equipos de A. Primaria. Hospital General Universitario J. M^a Morales Meseguer. Área VI.

Medicina de Urgencias

Pascual Piñera Salmerón

Hospital General Universitario Reina Sofía. Área VII.

Enfermería (por orden alfabético)

María José Clemente Laserna

Neumología. Hospital General Universitario

J. M^a Morales Meseguer. Área VI.

Josefa Fernández Baño

CS Torres de Cotillas. Área VI.

Antonia Ortiz Llor

SUAP MU Infante. Área VII.

Expertos en Calidad

Pedro Parra Hidalgo

Subdirección de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación.

José Eduardo Calle Urra

Subdirección General de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación.

Adelia Más Castillo

Subdirección General de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación.

Teresa Ramón Esparza

Subdirección General de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación.

Pilar López Acuña

Fundación para la Formación y la Investigación Sanitaria (FFIS).

Revisores Externos (por orden alfabético)

José Joaquín Gutiérrez García

Dirección General de Salud Pública y Adicciones.


José Antonio Navarro Alonso

Dirección General de Salud y Adicciones.

Fase I – EPOC ESTABLE

- ❖ En **2015** se creó un **grupo de trabajo** con participación de SOMUPAR y SMUMFYC, compuesto por médicos de familia, neumólogos, personal de enfermería y expertos en calidad.
- ❖ **Objetivo:** Elaboración de recomendaciones para mejorar la atención y la coordinación entre niveles asistenciales en la atención a pacientes con EPOC en el Servicio Murciano de Salud.

Fase I – EPOC ESTABLE



Fase I – EPOC ESTABLE

PLAN DE ACCIÓN

- ❖ **Constitución del grupo de Estrategia Regional de EPOC (22/02/2017).**
- ❖ **Creación de grupos de Área** (neumólogos, médicos de AP, enfermería y urgencias).
- ❖ **Continuar el plan de Formación:**
 - Espirometrías.
 - Terapia Inhalada.
 - Tabaquismo.
 - Actualización clínica.
- ❖ **Actualización plan personalizado en AP en OMI.**

Fase I – EPOC ESTABLE

Contenido		Meta	Área I	Área II	Área III	Área IV	Área V	Área VI	Área VII	Área VIII	Área IX
1.2.4.2	Adecuación diagnóstica de EPOC (espirometría)	≥ 80	1,7	0,5	0,9	0,0	3,0	0,9	1,4	0,0	0,0
1.2.4.3	Seguimiento de pacientes con EPOC (espirometrías)	≥20	2,7	4,2	2,8	3,1	3,5	3,9	4,1	0,5	3,7
1.2.4.5	Vacunación frente a la gripe	≥60	45,7	43,0	45,1	57,1	47,7	43,1	45,6	48,2	45,2
1.2.4.6	Vacunación frente al neumococo	≥60	50,4	52,1	56,8	60,8	61,0	54,1	54,3	53,1	58,8
1.2.4.7	Control del tabaquismo	≥60	8,8	7,8	6,9	6,3	4,9	8,9	9,1	4,9	3,4


Fase II – EPOC EXACERBADO

En **2016** el grupo de trabajo de EPOC con nuevas incorporaciones se reúne de nuevo.

OBJETIVO

Adaptación al SMS del Proceso asistencial integrado del paciente con EPOC exacerbado **incorporado** a la Estrategia del Sistema Nacional de Salud.

Fase II – EPOC EXACERBADO



EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA
CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL
PACIENTE CON EPOC

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN

- ❖ Las unidades de estudio han sido los pacientes mayores de 40 años dados de alta por exacerbación (o sospecha) de EPOC en el segundo semestre de 2014 y primer semestre de 2015.
- ❖ Se han evaluado 25 indicadores de proceso y resultado.

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN

- ❖ Elaboración de indicadores
- ❖ Trabajo de campo: 540 casos (60 por hospital o total de universo)
- ❖ Informe primer semestre de 2017

