



¿CÓMO ANDAMOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN AL PARTO NORMAL?



C Arellano Morata*, P Parra Hidalgo, JE Calle Urra, YA Fonseca Miranda, C López Rojo, MP López Acuña.

**Subdirección General de Calidad Asistencial.
Consejería de Sanidad y Política Social de Murcia**



- **Conocer** la adecuación de las prácticas sanitarias en la atención al parto normal en los 6 hospitales con maternidad del Servicio Murciano de Salud, en relación a las recomendaciones de la Estrategia de Atención al parto normal (EAPN) del Sistema Nacional de Salud
- **Identificar** la existencia de variabilidad en la práctica entre hospitales



Se evaluaron **17 indicadores** a partir de la EAPN

Unidades de estudio:

- Mujeres dadas de alta en 2009 con diagnóstico principal de parto vaginal o cesárea
- Mujeres ingresadas con diagnóstico principal de parto vaginal en el momento del estudio (2011)
- Protocolos en vigor

Tamaño muestral: 30 casos para cada uno de los indicadores en cada hospital, resultando 180 casos

Tipo de muestreo: aleatorio estratificado no proporcional por hospital y muestreo de conveniencia hasta completar tamaño muestral para los indicadores de entrevista



TABLA: INDICADORES

<u>INDICADOR DE ESTRUCTURA</u>	<u>VALOR</u>		
% DE CENTROS QUE DISPONEN DE PROTOCOLO COMPLETO DE ATENCIÓN AL PARTO Y NACIMIENTO	NO EXISTÍA PROTOCOLO COMPLETO EN NINGUNO		
<u>INDICADORES DE PROCESO Y RESULTADO</u>	<u>VALOR IC 95%</u>	<u>ESTÁNDAR</u>	<u>RAZÓN DE VARIACIÓN</u>
% DE PARTOS VAGINALES Y CESÁREAS URGENTES EN LOS QUE SE HA INDUCIDO EL PARTO EN GESTANTES DE 37 A 42 SEMANAS	31,2 (24,5-38,0)	<10%	1,83
% DE EPISIOTOMÍAS EN PARTOS EUTÓCICOS	35,4 (28,2-42,2)	<15%	4,03
% DE PARTOS VAGINALES TRAS CESÁREA PREVIA	43,8 (36,2-51,4)	60%-80%	2,57
% DE PARTOS VAGINALES EN LOS QUE SE HA REALIZADO LA MANIOBRA DE KRISTELLER EN GESTANTES DE 37 A 42	33,3 (26,4-40,2)	0	1,33
% DE PARTOS VAGINALES EN LOS QUE LA MADRE Y EL RECIÉN NACIDO HAN PERMANECIDO JUNTOS	49,2 (41,9-56,5)	100%	6,75
% DE PARTOS VAGINALES Y CESÁREAS URGENTES CON ANALGESIA LOCOREGIONAL EN GESTANTES DE 37 A 42 SEMANAS	67,9 (61,1-74,8)	30%-80%	1,79

RESULTADOS



- **Alta variabilidad entre hospitales y alejamiento de los estándares en algunos indicadores**
- **En cuatro de ellos (Partos inducidos, episiotomías en partos eutócicos, parto vaginal tras cesárea previa y contacto precoz madre-recién nacido) además de tener diferencias significativas con respecto al estándar propuesto, presentan una RV de 1,50 o más**
- **Como primera medida correctora esta en marcha la elaboración de un protocolo regional de atención al parto normal**

CONCLUSIONES