



## Prevalencia del consumo de drogas de abuso en la Región de Murcia en el año 1999

### Introducción.

La Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de Drogas, realizada en la Región de Murcia en 1999, constituye un importante instrumento que aporta valiosa información sobre la prevalencia de los consumos de las diferentes drogas entre los murcianos, los perfiles de la población consumidora así como aspectos básicos relacionados con los consumos de estas sustancias.

### Objetivo

Conocer la prevalencia de consumo de drogas de abuso, características sociodemográficas y aspectos relacionados con el consumo en la población residente en la Región de Murcia.

### Método.

Se diseñó una encuesta poblacional. El universo de la investigación está constituido por residentes en la Región de Murcia con edades entre 15 y 65 años. La muestra la forman 808 personas, a los cuales se les hizo una entrevista personal en el domicilio en la que se recogen datos sociodemográficos. Además se les distribuyó un cuestionario autoadministrado en el que se recogieron datos sobre consumo de alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, cocaína, heroína y otras sustancias adictivas. Ambos cuestionarios se validaron anteriormente. El mues-

treo fue polietápico, estratificado por conglomerados, en el diseño no se han admitido sustituciones ni de hogares ni de individuos, para cubrir las entrevistas irrealizables, por lo que se sobredimensionó la muestra. El trabajo de campo se realizó entre Octubre y Diciembre de 1999. Se estima la prevalencia de consumo. En este artículo se presentan los resultados de la parte de drogas de abuso del cuestionario autoadministrado.

### Resultados y Discusión.

Las prevalencias de consumo por orden de frecuencia y sexo se presentan en la Tabla 1.

El alcohol sigue siendo la sustancia de mayor consumo, un 89% de la población entre 15 y 65 años lo ha consumido en alguna ocasión. La prevalencia de consumo es similar a la Encuesta Domiciliaria sobre consumo de Drogas realizada en Marzo del año 1998 (EDCD98), que fue del 90,1%. (Gráfica 1).

Tabla 1. Prevalencias de consumo (%) de sustancias de abuso en la Región de Murcia alguna vez en la vida.


	1999	Hombres	Mujeres
Alcohol	89,0	92,2	85,9
Tabaco	73,7	78,3	69,0
Cannabis	24,7	31,9	17,5
Cocaína	4,1	6,1	2,1
Éxtasis	3,7	6,2	1,3
Anfetaminas, speed	3,3	4,7	1,9
Alucinógenos	2,2	3,8	0,6
Heroína	0,8	1,5	0,0
Otros opiáceos	0,8	1,0	0,6
Inhalables	0,6	1,0	0,2
Base, basuco, crack	0,5	0,8	0,2

Fuente: Encuesta Domiciliaria sobre consumo de Drogas 1999 (SITCAM).

La prevalencia de consumo de alcohol en el último año es del 80,9%, (86,8% en hombres y 75,1% en mujeres), ha aumentado en 1,8 puntos y en ambos sexos.

Un 78,9% consumió en el último mes, incrementándose en 1,2 puntos (84,9 % de los varones, al 73% de mujeres), ha aumentado el consumo en las mujeres en 2,4 puntos respecto a la anterior Encuesta.

Gráfica 1. Prevalencia de consumo de alcohol en población de 15-65 años en la Región de Murcia 1998-1999.



Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM). Encuestas domiciliarias sobre consumo de Drogas en la Región de Murcia 1998 y 1999. Servicio de Epidemiología.

**Tabla 2. Consumo de bebidas alcohólicas (%). TODOS LOS FINES DE SEMANA (en los últimos 30 días) en la Región de Murcia 1998-1999.**

	1998	1999
Cerveza / Sidra	26,1	<b>20,9</b>
Vino / Champán	16,8	<b>14,0</b>
Combinados / Cubatas	12,7	<b>11,3</b>
Licores Fuertes	1,9	<b>1,7</b>
Aperitivos / Vermut	1,7	<b>1,9</b>
Licores de Frutas	1,3	<b>0,9</b>

Fuente: Encuesta domiciliaria sobre consumo de Drogas 1999. (SITCAM).

El 12,6% bebe diariamente (18,4% de hombres frente al 6,9% de mujeres), descendiendo un 4,6% el consumo diario de alcohol, siendo este descenso mayor en hombres que

valores similares a los de la Encuesta del año 1998.

La frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas durante el fin de semana en los últimos 30 días, se presenta en la tabla 2. En la última encuesta realizada se observa un descenso en el consumo de bebidas alcohólicas (excepto aperitivos/vermut) durante todos los fines de semana respecto de la encuesta anterior. El mayor consumo sigue siendo la cerveza/sidra, aunque ha disminuido el consumo en un 8,1% los hombres y un 2,4% las mujeres. En segundo lugar esta el vino/champán y en tercer lugar los combinados/cubatas.


Los hombres tienen un consumo mayor que las mujeres para todos

ha disminuido el consumo en los hombres (del 19,3% al 15,1%) y ha aumentado ligeramente en las mujeres (del 6,1% al 7,4%) Gráfica 2. El 25,1% de los jóvenes de 15 a 24 años consume combinados/cubatas todos los fines de semana (produciéndose un aumento del 4,5% respecto de la anterior encuesta).

La frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas durante los días laborables en los últimos 30 días, se presenta en la tabla 3, por sexo.

El mayor consumo sigue siendo el de vino/champán, sin embargo hay un descenso en su consumo, el cual se debe a los hombres, que

**Gráfica 2. Consumo de bebidas alcohólicas TODOS LOS FINES DE SEMANA en la Región de Murcia 1999 según sexo.**



Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM). Encuesta domiciliaria sobre consumo de Drogas en la Región de Murcia 1999. Servicio de Epidemiología.

en mujeres (5,8% y 3,4% respectivamente). Por grupo de edad, el descenso se produce en los grupos de 25 y más años, mientras que en los menores de 25 años se mantiene en el mismo consumo.

La edad media de inicio en el consumo es de 16,8 años (15,9 en hombres frente a 17,8 de mujeres),

los tipos de alcohol, (Gráfica 2) excepto para la categoría de aperitivos/vermut. El descenso producido en el consumo de vino/champán respecto al año anterior ( del 16,8 al 14 %) (tabla 2) ha sido en ellos, aumenta con la edad mientras que en los combinados/cubatas es mayor el consumo cuanto más jóvenes son los encuestados, además

**Tabla 4. Días en los que se emborrachó en el último año %.**

	1998	1999
Todos los días	0,6	<b>0,1</b>
5 ó 6 días semana	0,3	-
3 ó 4 días semana	0,1	<b>0,2</b>
1 ó 2 días semana	1,1	<b>1,2</b>
1 a 3 días al mes	2,4	<b>3,9</b>
1 día cada 2/3 meses	3,2	<b>4,5</b>
1 ó 2 días al año	11,7	<b>11,8</b>
<b>Total</b>	<b>19,4</b>	<b>21,7</b>

Fuente: Encuesta domiciliaria sobre consumo de Drogas 1999. (SITCAM).

han pasado del 17,7 al 11,5 %. Le sigue en orden de frecuencia el consumo de cerveza/sidra, el resto tiene un consumo muy bajo.

Los hombres tienen un consumo mayor que las mujeres para todos los tipos de alcohol. El consumo de vino/champán en días laborables es mayor a medida que aumenta la edad, así en el grupo de 15-24 años el consumo es del 1,7%, hasta el grupo de 45-54 que llega al 21,6% (patrón de consumo observado en la ED98). La prevalencia de consumo de cerveza/sidra ha descendido ligeramente, en los hombres 1,1% mientras que en las mujeres aumentó en un 0,6 %, el grupo de 35-44 años es el que tiene un mayor consumo ( 14,3%).

Los episodios de intoxicación por ingesta abusiva de alcohol son bastante frecuentes, como pone de relieve que el 21,7% de los entrevistados se haya emborrachado al menos en una ocasión en el último año (27,9% hombres frente al 15,6% en mujeres), siendo mayor el número de casos que en la ED98. (Tabla 4)

La segunda sustancia más consumida es el tabaco (Tabla 6). Un 73,7% de los murcianos de 15 a 65

**Tabla 3. Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días TODOS LOS DÍAS LABORABLES Región de Murcia. Años 1998 y 1999.**

	1998	1999	Hombres 1999	Mujeres 1999
Vino / Champán	12,2	<b>8,9</b>	<b>11,5</b>	<b>6,3</b>
Cerveza / Sidra	8,9	<b>8,7</b>	<b>13,7</b>	<b>3,7</b>
Licores Fuertes	0,4	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
Aperitivos / Vermut	0,3	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
Licores de Frutas	0,3	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
Combinados / Cubatas	0,1	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>

Fuente: Encuesta Domiciliaria sobre consumo de Drogas 1999 (SITCAM).

Tabla 6. Edad de inicio en el consumo de tabaco por grupos de edad


Grupos de Edad	Edad media de inicio		% que ha fumado alguna vez	
	Murcia 1998	Murcia 1999	Murcia 1998	Murcia 1999
De 15 a 18 años	14,0	<b>14,3</b>	66,2	<b>65,3</b>
De 19 a 28 años	15,6	<b>15,7</b>	79,1	<b>73,7</b>
De 29 a 38 años	16,0	<b>15,6</b>	81,4	<b>82,5</b>
De 39 a 48 años	18,3	<b>16,8</b>	76,4	<b>79,2</b>
49 y más años	20,1	<b>20,7</b>	55,2	<b>63,6</b>
<b>Total población</b>	16,9	<b>16,8</b>	71,6	<b>73,7</b>

Fuente: Encuesta Domiciliaria sobre consumo de Drogas 1998 y 1999 (SITCAM).

años han probado en alguna ocasión el tabaco, (78,3% de los hombres, 69% de las mujeres), siendo la edad media de contacto con esta sustancia de 16,8 años para el con-

La edad de inicio en el consumo de tabaco, (Tabla 6) se mantiene similar a las de la Encuesta realizada en el año 1998, en la tabla siguiente.

Gráfica 3. Prevalencia de consumo de cannabis por sexo y grupo de edad en población de 15-65 años en la Región de Murcia 1999.




Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM). Encuesta domiciliaria sobre consumo de Drogas en la Región de Murcia 1999. Servicio de Epidemiología.

junto de la población. Las mujeres se inician o prueban por primera vez el tabaco a una edad más tardía (18 años frente a 15,8 de los hombres).

te se presentan las edades medias de inicio en el consumo según distintos grupos de edad y las prevalencias de consumo para estos grupos, en los cuales se observa un

Gráfica 4. Edad de inicio en el consumo de cannabis en población de 15-65 años en la Región de Murcia 1999.



Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM). Encuesta domiciliaria sobre consumo de Drogas en la Región de Murcia 1999. Servicio de Epidemiología.

Tabla 7. Prevalencia de consumo de cannabis % Región de Murcia.

	1998	1999
Ha probado alguna vez	22,8	<b>24,7</b>
Ha consumido en el último año	8,1	<b>10,9</b>
Ha consumido en el último mes	4,6	<b>4,0</b>
Consume a diario	0,5	<b>1,1</b>

Fuente: Encuesta domiciliaria sobre consumo de Drogas 1999. (SITCAM).

ligero descenso en los grupos de 15 a 28 años y un ligero aumento en el resto de los grupos.

El cannabis es la droga ilícita más consumida, un 24,7% la ha probado alguna vez (32% de los hombres y 17,5% de las mujeres). Se ha incrementado el consumo en el 2%, (Tabla 7), las mujeres han incrementado el consumo en un 4,3%, siendo las responsables del aumento global.

La distribución por grupo de edad y sexo se presenta en la Gráfica 3 donde se sigue observando una mayor prevalencia de consumo en los hombres.

El mayor consumo de cannabis, se produce en los hombres de 25 a 34 años, de los que el 49,5% la consumen.

Un 10,9% de los encuestados ha consumido cannabis en el último año (10,3% en hombres, 5,3% en mujeres), habiéndose duplicado el consumo en mujeres.

La prevalencia de consumo en el último mes fue del 4,3% (5,7% hombres y 3% mujeres), ha descendido en hombres y aumentado en mujeres.

Tabla 8. Prevalencia del consumo de cocaína en polvo (%) Región de Murcia

	Murcia 1998	Murcia 1999
Ha probado alguna vez	3,6	<b>4,1</b>
Ha consumido en el último año	2,0	<b>2,6</b>
Ha consumido en el último mes	0,6	<b>1,4</b>
Consume a diario	-	<b>0,1</b>

Fuente: Encuesta domiciliaria sobre consumo de Drogas 1999. (SITCAM).

La edad media de inicio en el consumo de cannabis está en los 18,8 años. El 82% de los que consumen cannabis han iniciado el consumo entre los 14 y 20 años (Gráfica 4).

El éxtasis, ha sido probado alguna vez por el 3,7% de la población entre los 15 y 65 años (6,2% hombres frente al 1,3% de mujeres). Se

*Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria.  
Semanas 49 a 52 (del 3 de diciembre al 30 de diciembre de 2000). Distribución semanal*

	Casos notificados												Casos acumulados			
	Semana 49			Semana 50			Semana 51			Semana 52			Semanas 1 a 52			
	2000	1999	Mediana	2000	1999	Mediana	2000	1999	Mediana	2000	1999	Mediana	2000	1999	Mediana	
<b>Enfermedades</b>																
Gripe	1980	929	1.784	1.784	1.453	2.017	2.017	1.484	2.256	2.313	1.689	3.794	3.794	104.744	167.048	123.866
Tuberculosis respiratoria	1980	3	0	1	2	1	2	5	4	2	4	2	1	188	145	173
Meningitis tuberculosa	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2
Otras tuberculosis	1986	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	33	31	32
Legionelosis	1997	0	5	2	3	1	0	0	2	0	5	2	0	23	19	19
Hepatitis A	1997	0	0	0	1	2	1	0	2	0	0	0	0	20	44	44
Hepatitis B	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	9	24
Otras hepatitis víricas	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	20	23
Fiebres tifoidea y par.	1980	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	11	20
Disentería	1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Toxiinfecciones-Alimen	1983	1	3	3	9	4	4	0	5	2	0	3	7	595	443	517
Varicela	1980	79	126	101	99	126	126	73	92	92	79	95	77	7.344	11.632	8.421
Sarampión	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	38
Rubeola	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	13	27
Parotiditis	1980	2	1	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	64	52	52
Tosferina	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	17	17
Enfermedad meningoc.	1980	2	0	1	0	2	1	0	0	1	1	1	2	37	51	45
Otras meningitis	1986	4	2	0	0	1	1	0	0	1	2	2	1	218	52	52
Sífilis	1982	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	15	17	20
Infección gonocócica	1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	17	18
Fiebre exantemática med.	1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	12
Brucelosis	1980	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	17	31	52
Sífilis congénita	1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Paludismo	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	2

*La mediana se calcula sobre el último quinquenio. No se incluyen las enfermedades sin casos notificados en año actual.*

*Porcentaje de declaración (\*)  
Semanas 49 a 52 (del 3 de diciembre al 30 de diciembre de 2000).*

Municipios	Población (Proyec. 2000)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1999)	% de declaración
Abanilla	6.153	87,5	Calasparra	8.934	100,0
Abarán	12.177	100,0	Campos del Río	2.005	50,0
Águilas	26.773	100,0	Caravaca de la Cruz	22.269	100,0
Albudeite	1.376	100,0	Cartagena	177.709	100,0
Alcantarilla	32.982	100,0	Cehegín	14.077	93,8
Aledo	1.005	87,5	Ceutí	7.153	100,0
Alguazas	7.021	100,0	Cieza	31.725	98,7
Alhama de Murcia	15.640	88,9	Fortuna	6.652	100,0
Archena	14.398	57,5	Fuente Álamo de Murcia	9.606	100,0
Beniel	7.974	100,0	Jumilla	20.573	58,3
Blanca	5.706	100,0	Librilla	3.873	75,0
Bullas	10.677	100,0	Lorca	70.689	85,6

*(\*) [Núm. partes de declaración numérica recibidos / (Núm. de médicos de atención primaria en las cuatro semanas)] x 100.*

*Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria.  
Semanas 49 a 52 (del 3 de diciembre al 30 de diciembre de 2000). Distribución semanal*

Población	Áreas de Salud												REGIÓN	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		TOTAL	
	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.
<b>Enfermedades</b>														
Gripe	2.052	41.139	577	17.375	1.122	17.463	105	7.660	125	3.844	1.574	17.263	5.555	104.744
Tuberculosis respiratoria	2	54	9	61	1	33	0	4	1	3	1	33	14	188
Meningitis tuberculosa	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Otras tuberculosis	1	12	1	14	0	5	0	0	0	1	0	1	2	33
Legionelosis	8	19	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	8	23
Hepatitis A	0	5	0	10	1	1	0	0	0	0	0	4	1	20
Hepatitis B	0	5	0	6	0	0	0	0	0	1	0	3	0	15
Otras hepatitis víricas	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7
Fiebres tifoidea y paratifoidea	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6
Disentería	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Toxiinfecciones-Alimen	0	313	0	128	1	60	0	13	7	31	2	50	10	595
Varicela	40	3.159	215	1.460	7	1.393	47	434	0	351	21	547	330	7.344
Sarampión	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Rubeola	0	8	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	12
Parotiditis	0	29	1	16	0	1	0	6	0	3	2	9	3	64
Tosferina	0	2	0	9	0	1	0	0	0	0	0	1	0	13
Enfermedad meningoc.	2	12	0	13	1	5	0	0	0	1	0	6	3	37
Otras meningitis	3	116	0	47	0	5	0	15	0	5	3	30	6	218
Sífilis	0	5	2	9	0	0	0	0	0	0	0	1	2	15
Infección gonocócica	0	7	0	8	0	0	0	1	0	0	0	2	0	18
Fiebre exantemática med.	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
Brucelosis	1	8	1	3	0	2	0	2	0	2	0	0	2	17
Sífilis congénita	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Paludismo	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

*No se incluyen las enfermedades sin casos notificados en año actual.*

*Porcentaje de declaración (\*)  
Semanas 49 a 52 (del 3 de diciembre al 30 de diciembre de 2000).*

Municipios	Población (Proyec. 2000)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1999)	% de declaración
Lorquí	5.527	100,0	Torre Pacheco	21.937	75,0
Mazarrón	17.478	100,0	Torres de Cotillas, Las	15.617	86,1
Molina de Segura	43.097	43,0	Totana	21.973	98,3
Moratalla	8.574	71,9	Ulea	956	50,0
Mula	13.632	100,0	Unión, La	14.386	100,0
Murcia	353.504	71,8	Villanueva del Río Segura	1.555	37,5
Ojós	589	62,5	Yecla	28.772	68,8
Pliego	3.401	100,0	Santomera	10.594	100,0
Puerto Lumbreras	10.658	100,0	Alcázares, Los	6.877	93,8
Ricote	1.579	25,0			
San Javier	18.267	100,0	Total Región	1.131.128	84,3
San Pedro del Pinatar	15.008	94,4			

ha producido un incremento del 2,6% respecto de la EDCD98, el aumento afecta a todos los grupos de edad y por sexo a los hombres. El 0,1% tiene un consumo diario de esta sustancia. (Gráfica 5)

La edad media la primera vez que probó el éxtasis, es de 21,2 años (22,1 en los hombres y 16,7 en las mujeres), se ha incrementado la edad media en 2,6 años, debido a la incorporación al consumo de hombres entre 19-48 años.

El consumo de cocaína, ha experimentado un ligero aumento en el consumo respecto del año 1998, (Tabla 8) siendo la prevalencia del 4,1% de los encuestados, los cuales refieren haberla consumido en alguna ocasión (6,1% en hombres y 2,1% en mujeres).

Tabla 9. Prevalencia del consumo de anfetaminas (%) Región de Murcia

	Murcia 1998	Murcia 1999
Ha probado alguna vez	1,7	3,3
Ha consumido en el último año	0,5	0,8
Ha consumido en el último mes	0,1	0,4

Fuente: Encuesta domiciliaria sobre consumo de Drogas 1999. (SITCAM).

res), afectando a ambos sexos y al grupo de edad de 25-44 años. La edad media de inicio en el consumo ha sido de 20,1 años.

La cocaína es la segunda sustancia ilícita más consumida, el 4,1% la han probado. En la gráfica 6 se compara por sexo y grupos de edad respecto de la encuesta anterior.


La prevalencia de consumo de anfetaminas/speed alguna vez en la vida es del 3,3% (Gráfica 7) (4,7% en hombres y 1,9% en mujeres). Se ha duplicado el consumo de estas sustancias desde la encuesta anterior. Por grupo de edad ha aumentado el consumo en todos ellos.

La edad media de inicio en el consumo ha sido de 19 años.

### Conclusiones.


En comparación con la Encuesta Domiciliaria sobre Drogas de Febrero de 1998, en todas las sustancias se ha observado un aumento en el consumo, la mayor diferencia se ha encontrado en el consumo de éxtasis cuya prevalencia ha aumentado del 1,1% en el año 1998 al 3,8% en el año 1999, afectando a todos los grupos de edad y por sexo a los hombres.

Gráfica 5. Prevalencia del consumo de éxtasis en población de 15-65 años en la Región de Murcia 1999.




Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM). Encuesta domiciliaria sobre consumo de Drogas en la Región de Murcia 1999. Servicio de Epidemiología.

Gráfica 6. Prevalencia de consumo de cocaína en polvo alguna vez, según sexo y grupo en población de 15-65 años en la Región de Murcia 1998 y 1999



Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM). Encuesta domiciliaria sobre consumo de Drogas en la Región de Murcia 1999. Servicio de Epidemiología.

Gráfica 7. Prevalencia del consumo de anfetaminas en población de 15-65 años en la Región de Murcia 1999.



Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM). Encuesta domiciliaria sobre consumo de Drogas en la Región de Murcia 1999. Servicio de Epidemiología.

tando a todos los grupos de edad. Por sexo sigue siendo mayor el consumo en hombres en todas las sustancias.

El consumo de **alcohol** es muy importante en nuestra Región, el 89% lo ha probado alguna vez, siendo mayor en los hombres 92,2% frente al 85,9% de mujeres. La prevalencia de consumo alguna vez, se mantiene estable, sin embargo el consumo en el último año y en los últimos 30 días ha aumentado (1,8% y 4,5% respectivamente). A la vez se ha producido un descenso importante de los consumidores diarios del 4,6% (12,6% de los encuestados), en los grupos de 25-65 años y mayor en los hombres que en las mujeres.

La edad media de inicio en el consumo es de 16,8 años. El 9,4% de los entrevistados que han probado/consumido alcohol, se iniciaron en el consumo antes de cumplir los 13 años, el 70,1% iniciaron el consumo entre los 14 y 18 años.

El consumo de bebidas durante el fin de semana ha descendido en las bebidas de mayor consumo cerveza/sidra, vino/champan y combinados/cubatas en 5,2%, 2,8% y 1,4% respectivamente. Sin embargo los jóvenes de 15 a 24 años han aumentado el consumo de combinados/cubatas los fines de semana en un 4,5% (25,1%), y de forma más importante en las mujeres. Ellas superan a los hombres en el consumo de aperitivos/vermut (2,6%).

El consumo de alcohol más frecuente durante la semana es por vino/champan y cerveza/sidra, si bien han descendido en el último año, de forma más importante el vino/champan en un 3,3%. Los hombres tienen un consumo mayor que las mujeres para todos los tipos de alcohol. El grupo de 15-24 años en días laborables tiene un consumo muy bajo, el 1,7% consume vino/champan y el 2,5% cerveza/sidra, siendo más importante el consumo en los grupos de más edad.

El consumo de **tabaco** en nuestra Región durante el año 1999 ha aumentado con relación a la EDUD98, así los murcianos/as que lo han probado alguna vez ha aumentado en el 2,1%, pasando del 71,6% al 73,7%. Por sexo, se observa un descenso del 5,1% en hombres y un aumento del 9,1% en

mujeres. Por grupos de edad, lo más importante es que desciende el consumo en el grupo de 15-24 años el 6,3%, a la vez que aumenta en el de 45-65 en un 8,5%.

El consumo en el último año en nuestra Región, ha aumentado ligeramente (1,6%) con relación a la última encuesta del año 1998 (50,7% frente al 49,1%). En el último mes el 45,7% de los encuestados han fumado, aumentando un 1,2%. Por sexo se observa lo mismo que para otros periodos, disminuye un 6,8% en hombres y aumenta un 9,1% en mujeres, respecto de la encuesta de Marzo del año 1998.

En resumen el consumo de tabaco, ha aumentado ligeramente respecto al año 1998. Se constata un desplazamiento por sexo, aumentando en las mujeres y descendiendo en los hombres. Además por grupos de edad disminuye en el de 15-24 años y aumenta en el de 45-65 años.

El consumo de **cannabis** se ha incrementado ligeramente en la Región debido al mayor consumo experimentado en las mujeres, que han aumentado el consumo alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes y el consumo diario. Los hombres solos han aumentado en el consumo diario, en las demás categorías ha descendido.

En relación al consumo alguna vez en la vida, sigue siendo mayor el consumo en los hombres (31,9%) frente a las mujeres (17,5%), si bien éstas han aumentado el consumo en el 4,3%. El grupo de edad de mayor consumo es el de los hombres de 25-34 años (49,5%). Le sigue en importancia el grupo de 15-24 años, en los que el 28,3% de las mujeres consumen esta sustancia, siendo mayor en los hombres (38%).

La edad media de inicio en el consumo de cannabis está en los 18,8 años.

El **éxtasis** es una sustancia de menor consumo, pero se ha observado un aumento en los consumos de alguna vez, en el último año, en el último mes del 3,7%, 0,7% y 0,6% en comparación con la Encuesta del año 1998.

La relación hombre mujer es de 6:1, siendo más frecuente el consumo en los hombres mayores de 19

años, mientras que en el grupo de 15 a 18 años consumen más las mujeres.

La edad media de inicio en el consumo en los hombres es de 22 años y en las mujeres de 16,7. Los encuestados que tienen un consumo diario (0,1%), son hombres entre los 15-24 años. El número medio de días que consumen éxtasis, en el último mes ha sido de 8,2.

La **cocaína** es la segunda sustancia ilícita de mayor consumo, el 4,1% de los encuestados de la Región dice haberla probado en alguna ocasión (3,6% en el año 1998).

La prevalencia de consumo de cocaína en Murcia ha aumentado para todos los tipos de consumo, siendo superior el consumo en 1998 y 1999 a la media española y en concordancia con los resultados del indicador tratamiento del Sistema de Información sobre Toxicomanías, donde en el año 1999 el 44% de los usuarios consumían cocaína.

El **resto de sustancias psicoactivas** han aumentado respecto a la EDUD98, pero de forma moderada debido a que son sustancias cuya frecuencia de consumo es baja, así han aumentado el consumo de anfetaminas que se ha duplicado respecto al año anterior, alucinógenos, heroína, otros opiáceos, inhalables y crack (3,3%, 2,2%, 0,8%, 0,8%, 0,6% y 0,5% respectivamente)

Juan Fco. Correa Rodríguez  
Servicio de Epidemiología  
Dirección General de Salud Pública  
Consejería de Sanidad y Consumo

# **XIX** *Murcia* del 17 al 19 de octubre de 2001

## **Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología**

**Ética, medio ambiente  
y comunicación:  
punto de encuentro  
de la epidemiología  
en el siglo XXI**



Región de Murcia  
Consejería de Sanidad y Consumo



SOCIEDAD  
ESPAÑOLA DE  
EPIDEMIOLOGÍA

Ubicada

**Auditorio y Centro de Congresos**

Secretaría Técnica

**Alquibla Congresos**

Tel: 968 33 10 20 Fax: 968 33 11 34  
info@alquibla.com

[www.um.es/siu/congre/see-murcia2001/](http://www.um.es/siu/congre/see-murcia2001/)

Suscripción: Envío gratuito. Solicitudes: Servicio de EPIDEMIOLOGÍA  
Dirección General de Salud Pública, Consejería de Sanidad y Consumo  
Ronda de Levante, 11. MURCIA 30008 (Correo electrónico: bolepi@carm.es)