



Región de Murcia
Consejería de Sanidad
Dirección General de Salud Pública
Servicio de Epidemiología

LA SALUD EN LA REGIÓN DE MURCIA EN EL CONTEXTO NACIONAL Y EUROPEO

INDICADORES DE SALUD

2005

Adaptado del documento "La salud de la población española en el contexto europeo y del Sistema Nacional de Salud", del Ministerio de Sanidad y Consumo

- Servicio de Epidemiología -
Dirección General de Salud Pública
Julio 2006

ÍNDICE

1. ESPERANZA DE VIDA

1.1. Esperanza de vida al nacimiento	5
1.2. Esperanza de vida libre de discapacidad	6
1.3. Esperanza de vida en buena salud.....	6

2. MORTALIDAD

2.1. Mortalidad por todas las causas	7
2.2. Enfermedades del aparato circulatorio	8
2.2.1. Enfermedad isquémica del corazón.....	9
2.2.2. Enfermedad cerebrovascular	10
2.3. Mortalidad por cáncer (tumores malignos)	11
2.3.1. Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón	12
2.3.2. Cáncer de mama en la mujer.....	13
2.3.3. Cáncer de colon	14
2.3.4. Cáncer de estómago	15
2.3.5. Cáncer de próstata.....	16
2.3.6. Cáncer de cuello de útero	17
2.4. Mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica.....	17
2.5. Mortalidad por diabetes mellitus	18
2.6. Mortalidad por enfermedad de Alzheimer.....	19
2.7. Mortalidad por cirrosis hepática y enfermedad crónica del hígado	20
2.8. Mortalidad por causas externas.....	21
2.8.1. Mortalidad por accidentes de tráfico	22
2.8.2. Mortalidad por suicidio	23
2.9. Mortalidad por enfermedades transmisibles	24
2.9.1. Mortalidad por sida.....	24
2.9.2. Mortalidad por neumonía y gripe	25
2.10. Mortalidad por causas relacionadas con el consumo de tabaco y alcohol	26
2.11. Mortalidad por causas relacionadas con la calidad del sistema sanitario.....	28
2.11.1. Mortalidad por hernia abdominal.....	28
2.11.2. Mortalidad por apendicitis	28
2.11.3. Mortalidad por efectos adversos de medicamentos	28

3. MORBILIDAD

3.1. Altas hospitalarias.....	29
3.1.1. Altas hospitalarias por enfermedades del aparato circulatorio	30
3.1.2. Altas hospitalarias por tumores malignos	30
3.1.3. Altas hospitalarias por enfermedades del aparato respiratorio	31
3.1.4. Altas hospitalarias por enfermedades del aparato digestivo	32
3.1.5. Altas hospitalarias por enfermedades del sistema musculoesquelético.....	33
3.2. Enfermedades infecciosas: enfermedades de declaración obligatoria	34
3.2.1. Enfermedades incluidas en el calendario vacunal.....	35
A. Parotiditis.....	35
B. Rubéola	36
C. Sarampión	37
D. Tos ferina	38
3.2.2. Hepatitis víricas	39
A. Hepatitis A	39
B. Hepatitis B	39
C. Otras hepatitis víricas.....	39

3.2.3. Enfermedades de transmisión sexual.....	40
A. Sífilis	40
B. Infección gonocócica.....	41
C. Sida	42
3.2.4. Paludismo.....	43
3.2.5. Incidencia de cáncer	44
3.2.6. Accidentes de tráfico.....	45
3.2.7. Accidentes de trabajo.....	47

4. INCAPACIDAD

4.1. Incapacidad permanente	48
4.2. Restricción temporal de la actividad	49

5. PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LA SALUD

50

6. SALUD MATERNO INFANTIL

6.1. Mortalidad infantil.....	51
6.1.1. Mortalidad infantil.....	51
6.1.2. Mortalidad neonatal.....	52
6.1.3. Mortalidad posneonatal.....	53
6.1.4. Mortalidad perinatal.....	54
6.1.5. Nacimientos según la edad de la madre.....	55
6.1.6. Nacimientos según el peso del recién nacido.....	56
6.1.7. Lactancia materna.....	57
6.1.8. Interrupción voluntaria del embarazo.....	58
6.1.9. Vacunación infantil	59


7. HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA

7.1. Consumo de tabaco.....	60
7.2. Consumo de alcohol	61
7.3. Consumo de otras drogas.....	63
7.4. Actividad física	64
7.5. Obesidad.....	65

1. ESPERANZA DE VIDA

1.1. Esperanza de vida al nacimiento.

Esperanza de vida al nacimiento según sexo. UE, España y Región de Murcia, 1991-2004															
	Ambos sexos					Hombres					Mujeres				
	1991	1995	2000	2002	2004	1991	1995	2000	2002	2004	1991	1995	2000	2002	2004
Región de Murcia	76,2	78,4	78,4	78,9	79,6	73,0	75,1	75,1	75,8	76,5	79,5	81,7	81,6	82,2	82,7
España	76,9	77,9	79,4	79,7		73,3	74,3	76,1	76,3		80,5	81,6	82,8	83,0	
Unión Europea (antes 2004)				79,1											
Países incorporados a la UE en 2004				74,2											



- La esperanza de vida entre 1990 y 2002 aumentó 2,8 años en España y 2,7 en la Región de Murcia.
- Durante ese mismo periodo en los países de la UE de antes de 2004 aumentó 2,6 años y en los países incorporados a la UE en 2004 aumentó en 3,4 años.

1.2. Esperanza de vida libre de discapacidad.

Esperanza de vida (EV), esperanza de vida libre de incapacidad (EVLI) y expectativa de incapacidad (I) al nacer, según sexo. España y Región de Murcia, 2000									
	Ambos sexos			Hombres			Mujeres		
	EV	EVLI	I	EV	EVLI	I	EV	EVLI	I
Región de Murcia	78,6	67,7	10,9	74,3	66,4	7,9	81,9	69,1	12,8
España	79,4	70,4	8,7	76,1	69,0	7,1	82,8	72,4	10,4

- La Región de Murcia (67,7 años) y Andalucía (67,9) son las comunidades autónomas con menor EVLI al nacer.

1.3. Esperanza de vida en buena salud.


Esperanza de vida (EV), esperanza de vida en buena salud (EVBS) y expectativa de mala salud subjetiva (MS) al nacer. España y Región de Murcia, 1991-2002						
	1991			2002		
	EV	EVBS	MS	EV	EVBS	MS
Región de Murcia	76,2	54,2	22,0	78,9	54,0	24,9
España	76,9	53,9	23,0	79,7	55,1	24,6

- En la Región de Murcia la esperanza de vida en buena salud ha permanecido estable entre 1991 y 2002, mientras en España ha aumentado en un año.

2. MORTALIDAD

2.1. Mortalidad por todas las causas.


Mortalidad por todas las causas. Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	966,6	839,0	836,5	841,1	836,8	867,1	798,3	770,1	770,9
España	855,1	801,3	795,8	772,4	776,4	778,8	738,3	719,9	718,8



- Entre 1990 y 2002, la mortalidad general descendió en la Región de Murcia un 20%.
- Entre 1990 y 2002 el exceso de mortalidad en Murcia sobre la media española se redujo en seis puntos (del 13% al 7%).
- A pesar de la reducción experimentada, en la Región de Murcia todavía existe mayor mortalidad general que en el conjunto estatal (770,9 frente a 718,8, de tasas ajustada por edad por cien mil habitantes, en 2002).

2.2. Enfermedades del aparato circulatorio.

Enfermedades del aparato circulatorio. Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	423,3	331,1	327,4	324,4	309,1	312,8	288,8	268,7	258,9
España	348	300,9	297,6	285,1	283,8	270,1	250,9	241,6	237,8



- La evolución de la tasa de mortalidad ajustada por edad entre 1990 y 2002 muestra que el riesgo de mortalidad por estas enfermedades en la Región descendió un 39% aproximadamente, algo más que en el caso de España (descendió aproximadamente un 32% tanto en hombres como en mujeres).
- Pese a que su reducción ha sido mayor durante todo el periodo, en 2002 la tasa mortalidad ajustada por edad continúa en esta Región (258,9 por 100.000 habitantes) siendo ligeramente superior al total nacional (237,8), constituyendo la Comunidad Autónoma con mayor tasa de mortalidad ajustada por edad después de Andalucía (293,9 por 100.000).

2.2.1. Enfermedad isquémica del corazón.

Enfermedad isquémica del corazón. Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002										
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	
Murcia	104	99,4	93,8	92,9	91,3	98,6	87,1	79,5	77,2	
España	87	86,6	87,8	85,9	86	84,9	79,9	76,9	76,1	




Figura 2.2.- Índice de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón, según comunidad autónoma. España, 2002.




Figura 2.1.- Índice de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón de la UE, 2002.



- La evolución del riesgo de mortalidad, evaluada a través de la tendencia en la tasa de mortalidad ajustada por edad, muestra que entre 1990 y 2002 el riesgo de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón descendió en la Región de Murcia un 26%, mientras que el descenso fue mucho menor en España (13%).
- Como consecuencia, el riesgo de mortalidad en Murcia se igualó al de España. En 1990, la Región de Murcia tenía un exceso de mortalidad del 20% comparado con la media española.
- Según datos de la Unión Europea, pese a la importancia de esta enfermedad como causa de muerte en España, en 2002 es el tercer país con menor mortalidad por enfermedad isquémica del corazón (un 40% inferior a la media de la Unión Europea).

2.2.2. Enfermedad cerebrovascular.

Enfermedad cerebrovascular. Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	155	110	110	109	104	104	100	89,9	85,5
España	111	91	86,2	81,7	79,8	78,7	72,3	70,2	67,2




Figura 2.4.- Índice de mortalidad por enfermedad cerebrovascular, según comunidad autónoma. España, 2002.






Figura 2.3.- Índice de mortalidad por enfermedad cerebrovascular. Países de la UE, 2002.



- Desde el año 1990 hasta 2002, el riesgo de mortalidad por enfermedad cerebrovascular ha descendido en Murcia un 45%, un porcentaje superior al observado en España (39%).
- Se ha reducido ligeramente en estos años el exceso de riesgo al comparar con España, pero todavía la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares es un 27% superior a la media española.
- La Región de Murcia es la segunda Comunidad Autónoma con una tasa más alta de mortalidad, ajustada por edad, por enfermedad cerebrovascular después de Andalucía (92,8 por 100.000 en 2002).
- España en la Unión Europea, España constituye el tercer país con menor mortalidad por enfermedad cerebrovascular (un 20% inferior a la media de la Unión Europea).

2.3. Mortalidad por cáncer.


Tumores malignos. Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	192,6	187,8	189,3	204,7	194,4	192,4	189,2	192,8	199,9
España	197,2	203,2	199,1	198,8	198	197,2	194,6	195,9	192,4



- La mortalidad por cáncer, con oscilaciones a lo largo de este periodo, presenta un aumento entre 1990 y 2002 del 4%, frente a un descenso del 2% para el total de España.
- En 2002 la tasa de mortalidad por esta causa ajustada por edad es un 4% superior al total nacional, siendo la cuarta comunidad autónoma con la tasa de mortalidad ajustada por edad más alta, tras Cantabria (208,9 por 100000), Asturias (205,9 por 100000) y País Vasco (200,7 por 100000).
- Los tumores malignos en España representan la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares (25,6% de todas las defunciones en 2002, 30,7 en hombres y 20% en mujeres).

2.3.1. Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.

Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón. Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	37	36,8	38	41	39,5	35,5	36,2	37,2	41,4
España	35,9	38,8	37,6	37,8	38,5	38,5	37,6	38,7	37,9



- La mortalidad es un 9% superior al total nacional (tasa ajustada de 41,4 frente a 37,9 por cien mil habitantes en 2002).
- El riesgo de muerte por cáncer de pulmón en la Región de Murcia se incrementó un 12% entre 1991 y 2002.
- Debido a que la tasa es mucho mayor en los hombres, el indicador global puede ser poco clarificador de la tendencia por sexo.
- Este tipo de tumor produce en España en los varones el 27% de las muertes por cáncer frente al 6% en las mujeres. Entre el 95 y el 2002 descendió un 5% en varones, sin embargo en mujeres, aunque con una incidencia muy baja su tasa se incrementó un 38% entre 1990 y 2002.
- España se encuentra entre los países de la Unión europea con una menor mortalidad por cáncer de pulmón en hombres y sobre todo en mujeres (10% y 60% inferior a la media de la Unión Europea respectivamente).

Figura 2.5.- Índice de mortalidad por cáncer de pulmón en hombres. Países de la UE, 2002.





Figura 2.6.- Índice de mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres. Países de la UE, 2002.



2.3.2. Cáncer de mama en la mujer.

Tumor maligno mama en mujeres. Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	13,2	13,9	13,8	13,6	14,3	13,5	12,1	12,6	12,7
España	13,9	14,3	13,4	13,2	12,9	12,7	12,3	12,6	12,1






Figura 2.7.- Índice de mortalidad por tumor maligno de mama en la mujer, según comunidad autónoma. España, 2002.



Base: 100. Medio de España


Figura 2.7.- Índice de mortalidad por cáncer de mama en mujeres. Países de la UE 2002.



- La tasa de mortalidad ajustada por edad en 2002 es muy similar a la del total nacional.
- La tasa de mortalidad ajustada por edad por esta enfermedad en la Región se incrementa hasta el año 98 un 8% y desciende hasta el 2002 un 11% a diferencia de lo que ocurre con el total nacional que a partir de 1995 y hasta el 2002 desciende un 15%.
- En España, al igual que en la Unión Europea (UE), la mortalidad por cáncer de mama en la mujer ha experimentado un descenso en la última década del siglo XX, siendo del 14% en España y del 8% en la UE.


2.3.3. Cáncer de colon.

Tumor maligno de colon. Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	13,1	16,8	16,8	18,0	17,6	18,2	18,5	17,8	18,2
España	14,4	17,5	17,4	17,7	18,1	18,0	18,1	18,4	18,1




- En la Región de Murcia en 2002 la tasa de mortalidad ajustada por edad por esta causa es similar al total nacional así como su evolución en el periodo 1990-2002 con un incremento del 39%.
- Es el segundo tumor maligno más frecuente en la mayoría de países occidentales después del cáncer de pulmón en los varones y el de mama en las mujeres y en España en 2002 supuso el 9,6% de las defunciones por todos los tumores malignos (8,5 en varones y 11,6 en mujeres), con un incremento del 26 % entre 1990 y 2002, 33% en varones y 16% en mujeres.

2.3.4. Cáncer de estómago.




- La mortalidad por tumor maligno de estómago en la Región en 2002 es similar al total nacional medido a través de la tasa ajustada de mortalidad
- El descenso en el periodo 1990-2002 ha sido menor, en Murcia disminuyó un 17% (con oscilaciones a lo largo del periodo) y en el total nacional descendió un 35% (32% en varones y 38,5 en mujeres).

2.3.5. Cáncer de próstata.



- La tasa de mortalidad ajustada por edad por cáncer de próstata en la región en 2002 es similar al total nacional.
- En la Región de Murcia se incrementa un 11% entre 1990 y 2002, mientras que en España desciende un 4% en el mismo periodo.


2.3.6. Cáncer de cuello de útero.



- La mortalidad por tumor maligno de cuello de útero es similar al total nacional en 2002.
- La tendencia permanece estable, tanto en la Comunidad como en España, en el periodo 1990-2002. Las fluctuaciones anuales se deben a la escasa magnitud de las cifras.

2.4. Mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	56,1	45,3	44,6	48,0	49,9	51,0	42,9	36,4	41,6
España	37,9	36,9	37,3	36,1	37,3	38,9	33,0	29,4	31,7



- Entre 1990 y 2002 el riesgo de mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica descendió en Murcia casi el doble que en España (26% y 16%, respectivamente).
- A pesar del descenso en estos últimos 13 años, el riesgo de mortalidad en 2002 por esta enfermedad en Murcia, medido a través de la tasa ajustada por edad, es un 31% superior al de la media española.
- Murcia es la segunda comunidad autónoma, después de Asturias, con una mortalidad más alta por esta enfermedad, con una tasa de 41,6 por 100.000 habitantes mientras en el total nacional es de 31,7 por 100.000 habitantes (59,3 y 13,3 por 100.000 habitantes en varones y en mujeres respectivamente).
- En España esta enfermedad representó en 2002 el 4,6 % de todas las defunciones (6,5% y 2,5 % en varones y en mujeres respectivamente).

2.5. Mortalidad por diabetes mellitus.

Diabetes mellitus . Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	23,9	27,1	23,4	20,3	25,0	25,5	22,9	23,4	21,5
España	23,1	20,9	20,0	19,2	20,1	19,9	18,4	18,6	18,4




Figura 2.11.- Índice de mortalidad por diabetes mellitus, según comunidad autónoma. España, 2002.






Figura 2.9.- Índice de mortalidad por diabetes mellitus. Países de la UE, 2002.



- En la Región de Murcia la tasa ajustada por edad es de 21,5 por 100.000 habitantes, es la cuarta comunidad autónoma con una tasa de mortalidad por esta enfermedad más elevada (17% superior al total nacional), siendo Canarias y Andalucía las dos comunidades autónomas con una mortalidad más alta (73% y 51% superior a la media respectivamente).
- En cuanto a su evolución disminuye en el total del periodo 1990-2002, pero con oscilaciones, a partir de 1999 y hasta 2002 desciende un 16%.
- En cuanto a datos europeos España muestra una mortalidad un 10% superior a la media europea, que disminuyó entre 1990 y 2002 un 12% en el conjunto de los 15 países que formaban parte de la Unión Europea antes de 2004 y un 22% en el conjunto de países que se incorporaron a la Unión Europea en 2004.

2.6. Mortalidad por enfermedad de Alzheimer.


Enfermedad de Alzheimer. Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	1,8	3,6	4,9	4,1	6,1	12,7	8,7	10,3	13,0
España	2,3	5,0	5,2	5,8	6,8	10,2	10,5	11,8	12,5



- En 2002 la tasa de mortalidad ajustada por edad en Murcia fue de 13 por 100000 habitantes muy similar al total nacional (12,5, 10,2 en varones y 13,8 en mujeres respectivamente).
- En ambos casos el riesgo de mortalidad por esta enfermedad se ha multiplicado por 6 y por 7 en el total nacional y en la Región de Murcia en el periodo 1990-2002, aunque puede ser debido, al menos parcialmente, a un cambio en el patrón de diagnóstico.

2.7. Mortalidad por cirrosis hepática y enfermedad crónica del hígado.


Enfermedad crónica del hígado. Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	23,6	20,1	17,1	18,0	16,1	16,2	13,8	13,4	12,7
España	20,3	16,4	15,8	14,8	14,1	12,2	11,4	11,0	10,8



- En Murcia la tasa de mortalidad es de 12,7 por 100.000 habitantes, superior al total nacional, constituyendo la cuarta comunidad autónoma con una tasa superior, tras la Comunidad Valenciana, Asturias y Andalucía.
- Tanto en el caso de España como en Murcia la mortalidad por esta enfermedad experimentó un considerable descenso (47% y 46% respectivamente) entre 1990 y 2002.
- Esta enfermedad en España representa el 1,4% de las defunciones en 2002, con una tasa de mortalidad de 10,8 por 100.000 habitantes (17 y 5,4 en varones y mujeres respectivamente).
- Por otro lado, España es de los países que presentan menor mortalidad por cirrosis hepática dentro de la Unión Europea, un 25% inferior a la media y el segundo país donde la mortalidad por esta enfermedad experimentó un mayor descenso, 45% entre 1990 y 2002.

2.8. Mortalidad por causas externas.


Accidentes y causas externas. Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	52,2	41,2	39,6	39,8	42,1	40,9	43,6	42,9	40,4
España	48,4	39,8	39,4	39,3	39,8	38,3	38,2	36,2	35,7



- La tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes y causas externas en 2002 en la Región de Murcia es de 40,4 por 100.000 habitantes (55 en varones y 17,6 en mujeres), un 13% superior al total nacional (40,4 por 100.000 habitantes), constituyendo la segunda comunidad autónoma con una mortalidad más alta por esta causa, después de la Rioja.


2.8.1. Mortalidad por accidentes de tráfico.

Accidentes de tráfico. Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	26,8	15,1	14,0	15,7	17,9	17,4	18,8	21,4	17,4
España	20,5	14,3	13,9	14,2	15,1	14,8	14,9	13,9	13,3




- El riesgo de mortalidad por esta causa en la Región de Murcia medido a través de la tasa de mortalidad ajustada por edad es de 17,4 por 100.000 habitantes en 2002, un 31% mayor que el total nacional, constituyendo después del País Vasco, la comunidad autónoma con mayor mortalidad por esta causa.
- Esta causa de mortalidad en España representa el 35% de las defunciones por causas externas y el 1,5 del total de defunciones, si bien su importancia como causa de mortalidad es mucho mayor en los intervalos de edad más jóvenes (supone el 15% de las defunciones entre los 15 y 44 años y un 55% de los fallecidos por accidente de tráfico tienen esta edad) y en los varones que en las mujeres (21,1 y 5,9 por 100000 habitantes respectivamente).
- En el caso de la Unión europea se produjo en este mismo periodo una disminución similar (30% en los 15 países que formaban parte de la UE antes de 2004 y 35% en los países que se incorporaron a la UE en 2004), aunque España muestra una mortalidad en 2002 un 26% superior a la media europea.

Figura 2.10.- Índice de mortalidad por accidentes de tráfico. Países de la UE, 2002




2.8.2. Mortalidad por suicidio.

Suicidio. Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	7,3	9,3	8,9	9,9	9,7	10,1	9,8	7,7	8,0
España	7,5	7,6	7,9	8,0	7,6	7,4	7,7	7,1	7,4



- La tasa de mortalidad ajustada en Murcia por esta causa es muy similar al total nacional (8 y 7,4 por 100.000 habitantes en 2002 respectivamente).
- En ambos casos esta tasa casi no se ha modificado a lo largo del periodo 1990-2004, aunque en el caso de Murcia a experimentado un aumento importante en el periodo 1990-95 y una disminución en el periodo 2000-2001.
- Se trata de una causa de muerte más frecuente en varones que en mujeres con una tasa de mortalidad ajustada en España de 12 y 3,4 por 100.000 habitantes en 2002 respectivamente. Dentro de la unión Europea España es el quinto país con una menor mortalidad por suicidio, un 40% inferior a la media.


Figura 2.12.- Índice de mortalidad por suicidio. Países de la UE, 2002.



2.9. Mortalidad por enfermedades transmisibles.

2.9.1. Mortalidad por sida.


Sida. Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	2,7	8,3	9,2	5,6	2,1	3,2	2,2	3,4	2,5
España	4,9	13,7	13,2	6,8	4,2	4,1	3,8	3,5	3,4



- Murcia tiene una tasa de mortalidad ajustada por edad de 2,5 por 100.000 habitantes, un 27% inferior al total nacional, la sexta comunidad autónoma con menor mortalidad por esta causa (tras Castilla -La Mancha, Extremadura, Navarra, Aragón y Cantabria).
- Entre 1996 y 2002 ha seguido una tendencia descendente con una reducción del 70%. El descenso se inicia un año después que en el conjunto de España.

2.9.2. Mortalidad por neumonía y gripe.


Neumonía e influenza. Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	22,5	13,1	12,6	12,5	15,8	20,7	15,1	13,6	14,9
España	21,0	17,1	16,8	16,8	17,8	19,2	16,4	13,7	15,3



- La mortalidad por esta causa en Murcia es similar al total nacional (14,9 y 15,3 por 100.000 habitantes respectivamente).
- Ha experimentado una reducción del 34% entre 1990 y 2002 (27% en el total nacional), aunque con periodos de crecimiento entre el 97 y 99.
- Es una de las primeras causas de muerte en los países desarrollados, en España en 2002 representó el 2,2% de las defunciones y afecta sobre todo a personas de edad avanzada.

2.10. Mortalidad por causas relacionadas con el consumo de tabaco¹ y alcohol².

	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	366,7	304,9	297,6	303,7	298,5	302,1	278,6	254,0	258,9
España	286,3	267,4	262,4	255,3	254,8	254,0	235,6	227,8	225,1



- En 2002 la Región de Murcia es la comunidad autónoma con la mortalidad más alta por causas relacionadas con el tabaco (258,9 por 100000, un 15% superior al total nacional).
- La mortalidad por causas relacionadas con el tabaco descendió en la Región un 29%, acortando diferencias a lo largo del periodo 1990-2002 con la media española.

¹ Se incluyen las defunciones por cáncer de boca, faringe, tráquea, bronquios y pulmón, esófago, enfermedad isquémica del corazón, enfermedad cerebrovascular y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

² Se incluyen las defunciones por cáncer de esófago, cáncer de laringe, síndrome de dependencia alcohólica, enfermedad crónica del hígado y cirrosis hepática.

Causas relacionadas con el consumo de alcohol. Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	87,3	70,0	63,8	66,2	67,1	67,9	67,0	64,9	63,1
España	79,0	65,5	64,4	63,1	62,5	61,6	60,3	57,7	56,4




- La mortalidad por causas relacionadas con el alcohol descendió en la Región un 28%.
- En 2002 la tasa de mortalidad por causas relacionadas con el alcohol, ajustada por edad, es un 12% superior al total nacional. La Región de Murcia es la segunda comunidad autónoma con la mortalidad más alta, después de La Rioja.

2.11. Mortalidad por causas relacionadas con la calidad del sistema sanitario¹.

- Globalmente, las tasas y la evolución de las causas de mortalidad evitable es similar en España y Murcia, aunque ésta destaque en el 2002, por el incremento en reacciones adversas a medicamentos (1,7 muertes por cien mil habitantes).


2.11.1. Mortalidad por hernia abdominal.

	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	3,2	4,3	2,7	3,1	3,1	4,0	3,2	2,9	3,6
España	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,6	3,2	3,3	3,4




2.11.2. Mortalidad por apendicitis.

	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7	0,0	0,2	0,2
España	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3



2.11.3. Mortalidad por efectos adversos de medicamentos

	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	0,2	0,4	0,7	0,7	0,2	0,5	0,8	1,2	1,7
España	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4




¹ Son defunciones que se supone no deberían haberse producido de haber existido un adecuado funcionamiento del sistema sanitario. Se incluye apendicitis, hernia y obstrucción intestinal y efectos adversos de los agentes terapéuticos.

3. MORBILIDAD

3.1. Altas hospitalarias.

3.1.1. Altas hospitalarias por enfermedades del aparato circulatorio.


Enfermedades del aparato circulatorio. Tasa de altas hospitalarias ajustadas por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	841,9	985,8	1240,8	1280,4	1323,9	1310,2	1229,1	1264,9	1246,7
España	780,4	1027,1	1083,1	1112,2	1140,6	1187,8	1191,3	1190,2	1202,1



- En el año 2002 la tasa de altas hospitalarias en la Región de Murcia por este grupo de enfermedades es muy similar a la del conjunto nacional.
- Las tasas experimentan un incremento del 48% en el total del periodo, siguiendo una tendencia ascendente hasta el año 1997, a partir del cual, a diferencia de lo que ocurre en el conjunto nacional, descienden ligeramente, estabilizándose a partir del año 2000.
- En el periodo 1990-2002 las tasas de altas hospitalarias por 100.000 habitantes en el conjunto de países que formaban parte de la Unión Europea antes de 2004 se incrementaron un 18% y en los países que se incorporaron a la UE en 2004 un 25%. En España la tasa bruta aumentó un 80%.

3.1.2. Altas hospitalarias por tumores malignos.


Tumores malignos. Tasa de altas hospitalarias ajustadas por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	405,9	560	622,6	578,8	536	545,5	486,1	572,8	593,5
España	463,3	540,4	547,2	564,5	565,2	586,2	591,8	600,0	603,8



- La tasa de altas hospitalarias por tumores malignos la ajustada por edad en el año 2002 es también semejante al total nacional, si bien su tendencia experimenta oscilaciones a lo largo del periodo, con un incremento del 53% entre 1990 y 1996 y una disminución del 23% hasta el año 2000, a partir del cual de nuevo sufre un incremento del 22%.
- En el periodo 1990-2002 las tasas de altas hospitalarias por 100.000 habitantes en el conjunto de países que formaban parte de la Unión Europea antes de 2004 se incrementaron un 10% y en los países que se incorporaron a la UE en 2004 un 50%. En España la tasa bruta aumentó un 50%.

3.1.3. Altas hospitalarias por enfermedades del aparato respiratorio.


Enfermedades del aparato respiratorio. Tasa de altas hospitalarias ajustadas por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	680,9	763,2	984,2	1046,3	978,3	910,5	864,5	888	1042,8
España	699,3	874,8	948,8	968,6	998,3	1041,3	1020,0	954,1	994,7



- Este grupo de enfermedades presentan, en la Región de Murcia, unas tasas de altas hospitalarias similares al conjunto nacional tanto puntualmente en 2002 como en la tendencia al incremento a lo largo del periodo (53% la Región de Murcia, 42% España). Pese a esto las tasas en la Región de Murcia presentan algunas oscilaciones con un importante aumento hasta 1997, una reducción hasta el año 2000 y un nuevo incremento hasta 2002.
- En el periodo 1990-2002 las tasas de altas hospitalarias por 100.000 habitantes en el conjunto de países que formaban parte de la Unión Europea antes de 2004 se incrementaron un 4% y en los países que se incorporaron a la UE en 2004 se mantuvieron estabilizadas. En España la tasa bruta aumentó un 50%.

3.1.4. Altas hospitalarias por enfermedades del aparato digestivo.


Enfermedades del aparato digestivo. Tasa de altas hospitalarias ajustadas por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	1013,3	1183,7	1298,2	1246,4	1264,4	1142,7	1188,3	1172,1	1190,9
España	968,6	1134,5	1182,5	1223,7	1208,9	1212,1	1207,4	1195,3	1196,1



- Las altas hospitalarias por enfermedades del aparato digestivo en la Región de nuevo es similar al conjunto nacional, tanto al inicio como al final del periodo analizado, pero sigue una tendencia más oscilante: ascendente hasta 1996, una reducción hasta 1999, estabilizándose hasta el final del periodo.
- En el periodo 1990-2002 las tasas de altas hospitalarias por 100.000 habitantes en el conjunto de países que formaban parte de la Unión Europea antes de 2004 se incrementaron un 11% y en los países que se incorporaron a la UE en 2004 un 5%. En España la tasa bruta aumentó un 25%.

3.1.5. Altas hospitalarias por enfermedades del sistema musculoesquelético.


Enfermedades del sistema musculoesquelético. Tasa de altas hospitalarias ajustadas por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	381,8	365,7	415,8	469,9	438,3	422,6	433,6	390,0	471,8
España	375,6	481,4	549,6	583,5	590,1	603,1	626,7	618,5	642,4



- La Región de Murcia constituye una de las tres comunidades autónomas con una menor tasa de altas hospitalarias por estas enfermedades en 2002 (un 27% inferior al total nacional), con un incremento menor a lo largo del periodo (un 24% y un 71% en Murcia y en total nacional respectivamente).
- En el periodo 1990-2002 las tasas de altas hospitalarias por 100.000 habitantes en el conjunto de países que formaban parte de la Unión Europea antes de 2004 se incrementaron un 15% y en los países que se incorporaron a la UE en 2004 un 25%. En España la tasa bruta aumentó un 85%.

3.2. Enfermedades infecciosas: enfermedades de declaración obligatoria.

Enfermedades infecciosas. Tasa de altas hospitalarias ajustadas por edad por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	183,4	161,5	215,9	217,1	270,1	165,3	187,4	230,9	242,4
España	215,4	212,7	218,8	226,4	214,9	217,1	230,8	220,7	195,8




- La Región de Murcia no presenta importantes diferencias con la media nacional durante el periodo 1990-2002. Generalmente ha estado ligeramente por debajo de la media aunque en los dos últimos años las tasas son superiores.

3.2.1. Enfermedades incluidas en el calendario vacunal.

- En general las enfermedades incluidas en el calendario vacunal en España siguen una tendencia decreciente desde el año 1991, excepto en el caso de la parotiditis que presentó algunas ondas epidémicas, esta misma tendencia también se observa en el caso de Murcia aunque en diferentes puntos temporales.
- En general, en 2003-2004 la incidencia de estas enfermedades en Murcia fue similar a la incidencia media en España.

A. Parotiditis.

Parotiditis. Tasa de casos declarados por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1996-2004									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Murcia	4,0	6,3	11,6	4,7	5,8	11,6	3,8	4,0	4,5
España	37,4	17,8	7,3	10,5	23,5	19,7	11,4	4,2	3,7



B. Rubéola.

Rubéola. Tasa de casos declarados por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1996-2004									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Murcia	22,3	7,5	2,1	1,2	1,1	0,2	0,5	0,8	0,8
España	43,2	9,7	2,3	1,4	0,9	0,5	0,4	0,3	0,2





Figura 3.2.- Evolución de la incidencia de rubeola por 100.000 habitantes en la UE y en España, 1991-2003.



- Se produce una importante disminución en la Unión Europea en la incidencia de rubéola en el periodo 1991-2003: el número de casos por 100.000 habitantes disminuyó de 20 a 0,5 en los países que formaban parte de la Unión Europea antes de 2004 y de 113 a 15 en los países que se incorporaron en 2004. En España esta disminución fue de 84 a 0,3 casos.

C. Sarampión.

Sarampión. Tasa de casos declarados por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1996-2004									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Murcia	4,3	3,6	1,1	1,2	0,3	0,0	0,1	0,5	0,2
España	12,6	4,7	1,1	0,6	0,4	0,2	0,2	0,6	0,1






Figura 3.1.- Evolución de la incidencia de sarampión por 100.000 habitantes en la UE y en España, 1991-2003.



- Se produce una importante disminución en la Unión Europea en la incidencia de sarampión en el periodo 1991-2003: el número de casos por 100.000 habitantes disminuyó de 64 a 4 en los países que formaban parte de la Unión Europea antes de 2004 y de 82 a 5 en los países que se incorporaron en 2004. En España esta disminución fue de 63 a 0,6 casos.

D. Tos ferina.

Tos Ferina. Tasa de casos declarados por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1996-2004									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Murcia	1,6	4,6	1,3	1,5	1,2	2,2	0,1	0,2	1,1
España	9,1	2,9	0,8	1,0	2,3	1,0	0,9	1,4	1,3





3.2.2. Hepatitis víricas.

A. Hepatitis A.


Tasa de casos declarados por 100.000 habitantes. UE, España y Región de Murcia, 1997-2004								
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Murcia	2,5	6,9	4,0	1,8	2,3	2,3	1,1	2,2
España	4,6	5,2	3,7	2,5	2,3	1,6	1,9	2,0
Unión Europea							1,7	
Unión Europea (países antes de 2004)							3,9	
Unión Europea (países incorporados en 2004)							4,2	

B. Hepatitis B.

Tasa de casos declarados por 100.000 habitantes. UE, España y Región de Murcia, 1997-2004								
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Murcia	2,9	2,2	0,8	1,4	1,4	1,3	2,0	1,2
España	3,0	2,9	2,4	2,2	2,0	2,1	2,0	1,9
Unión Europea							3,4	
Unión Europea (países antes de 2004)							3,0	
Unión Europea (países incorporados en 2004)							4,8	



C. Otras hepatitis víricas.




- Los casos declarados muestran una tendencia descendente desde los años 90, tanto en el ámbito estatal como en el regional.
- En el conjunto de países que formaban parte de la UE en 2004 el número de casos de hepatitis vírica A por 100.000 habitantes disminuyó de 84 a 4 y de 26 a 4 en los que se incorporaron en 2004. En Murcia la incidencia en 2003 era algo inferior a la media de España y de la Unión Europea.
- En los países que formaban parte de la UE la incidencia de la hepatitis vírica B permaneció estabilizada (se pasó de 4 casos por 100.000 habitantes en 1991 a 3 en 2003) y se experimentó un notable descenso en los países que se incorporaron en 2004 (de 25 a 5 casos por 100.000 habitantes). También en este caso la incidencia es menor en la Región que en la media de la Unión Europea, aunque se estima que existe subnotificación de esta enfermedad.

3.2.3. Enfermedades de transmisión sexual.


A. Sífilis.

Sífilis. Tasa de casos declarados por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1996-2004									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Murcia	1,3	2,0	2,8	1,5	1,4	3,0	3,0	2,9	3,3
España	2,1	1,9	2,0	1,7	1,8	1,8	1,9	2,3	2,7



- El número de casos declarados por 100.000 habitantes en la Región es algo superior a la media estatal a partir del año 2001.


Figura 3.3.- Evolución de la incidencia de sífilis por 100.000 habitantes en la UE y en España, 1991-2003.



- En el conjunto de países que formaban parte de UE antes de 2004 la incidencia venía descendiendo desde el inicio de los años 90, pero desde finales de esta década ha experimentado un aumento. En los países que se incorporaron en 2004 la incidencia ha experimentado un descenso paulatino desde mediados de los 90.

B. Infección gonocócica.


Infección Gonocócica. Tasa de casos declarados por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1996-2004									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Murcia	1,7	1,7	1,6	1,5	1,6	1,7	1,2	1,6	1,5
España	10,1	6,0	5,5	3,7	2,7	2,0	2,1	2,7	2,2



- A diferencia del descenso experimentado en el conjunto del Estado desde mediados de los 90, en la Región de Murcia la incidencia de esta enfermedad se mantiene constante, aunque continúa por debajo de la incidencia media registrada en España.

C. Sida.


Sida. Tasa de casos declarados por millón de habitantes. UE, España y Región de Murcia, 1996-2003								
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Murcia	124,1	91,5	70,1	75,4	64,7	65,9	51,0	52,9
España	169,0	123,4	91,8	77,1	69,2	58,2	52,7	47,0
Unión Europea								14,2
Unión Europea (países antes de 2004)								16,1
Unión Europea (países incorporados en 2004)								3,9



- En la Región de Murcia, aunque con un importante descenso a lo largo del periodo, los casos declarados por 100.000 habitantes son superiores a la incidencia media estatal desde el año 2001.
- En los países que formaban parte de la UE antes de 2004 la incidencia presentó una tendencia ascendente hasta mediados de los años 90. A partir de entonces la incidencia ha presentado un declive (67,2 por 100.000 habitantes en 95 a 16,1 en 2003). En los países que se incorporaron a la UE en 2004 la incidencia ha presentado un ascenso de 1,2 en 1992 a 3,9 en 2003.
- España constituye uno de los países con una incidencia más alta en 2003 junto con Portugal e Italia (78,2 y 30,5 por 100.000 habitantes respectivamente).

3.2.4. Paludismo.

Paludismo. Tasa de casos declarados por 100.000 habitantes. España y Región de Murcia, 1996-2004									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Murcia	0,2	0,1	0,4	0,3	0,2	0,6	0,9	0,3	0,4
España	0,6	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,1	1,2	0,9



- El paludismo dejó de ser una enfermedad endémica en España en 1964, año en que nuestro país recibió el certificado internacional de erradicación. Desde entonces su patrón epidemiológico cambió, presentándose en forma de casos importados.
- La tendencia es de ascendente hasta los primeros años del nuevo siglo.

3.2.5. Incidencia de cáncer¹.

Figura 3.5.- Incidencia de cáncer de pulmón por 100.000 habitantes en diferentes registros de cáncer en España. Periodo 1993-1997.




Figura 3.6.- Incidencia de cáncer de colon por 100.000 habitantes en diferentes registros de cáncer en España. Periodo 1993-1997.




Figura 3.7.- Incidencia de cáncer de estómago por 100.000 habitantes en diferentes registros de cáncer en España. Periodo 1993-1997.





Figura 3.8.- Incidencia de cáncer de mama en la mujer y de próstata en el varón. por 100.000 habitantes en diferentes registros de cáncer en España. Periodo 1993-1997.




¹ Las tasas que se ofrecen en el informe son tasas brutas, por lo que resulta difícil hacer comparaciones entre registros de cáncer. El lector puede consultar una publicación del Registro de Cáncer de Murcia que contiene tasas y gráficos con las tasas ajustadas, comparando la incidencia de distintos tipos de cáncer en la Región de Murcia con la de otros registros españoles y europeos, publicada en el Volumen VIII de *Cancer Incidence in Five Continents*. (http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/42258-REGISTRO_CANCER.PDF. Consultado el 31 de Julio de 2006)

3.2.6. Accidentes de tráfico.

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Murcia	1558	1605	1629	1782	1731	1749	1793	1760	1863
España	1522	1515	1520	1510	1520	1529	1545	1547	1561





	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Murcia	70,4	73,2	82,2	94,4	72,3	74,4	105,8	92,8	105,2
España	68,8	64,1	65,1	61,1	58,7	56,8	55,0	54,3	54,0



- La Región de Murcia se sitúa en primer y segundo lugar entre las comunidades autónomas con una tasa de víctimas y defunciones por 1.000 accidentes de tráfico más alta respectivamente. Dichas tasas aumentan a lo largo del periodo analizado un 20% y un 50%, aunque en el caso de la tasa de defunciones experimenta un descenso entre los años 1998 y 2001.

Tasa de víctimas por accidentes de tráfico por 100.000 habitantes. UE, España y Región de Murcia, 1995-2003									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Murcia	253	239	247	287	327	345	278	260	263
España	324	330	333	374	377	394	385	376	382
Unión Europea								425	
Unión Europea (países antes de 2004)								460	
Unión Europea (países incorporados en 2004)								246	
Tasa de defunciones por accidentes de tráfico por 100.000 habitantes. UE, España y Región de Murcia, 1995-2003									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Murcia	11,4	10,9	12,5	15,2	13,7	14,7	16,4	13,7	14,8
España	14,7	14,0	14,3	15,1	14,6	14,6	13,7	13,2	13,2



- La tasa de víctimas por accidente de tráfico por 100.000 habitantes en la Región es inferior al total nacional en 2003 y también al total de los países de la Unión Europea en 2002. Experimenta una tendencia creciente hasta el año 2000 y disminuye hasta el 2003.
- La tasa de defunciones por accidente de tráfico por 100.000 habitantes en Murcia es ligeramente inferior al total nacional en 2003 y sigue una tendencia variable a lo largo del periodo, alcanzando los puntos más elevados en 1998 y 2001.


3.2.7. Accidentes de trabajo.

Índice de frecuencia* de accidentes de trabajo. España y Región de Murcia, 1995-2003									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Murcia	47,5	50,5	55,3	58,1	59,8	56,8	48,1	43,1	35,1
España	33,9	35,5	37,3	39,3	42,9	43,7	42,8	41,2	37,6

*Número de accidentes con baja durante la jornada de trabajo por millón de horas-hombre trabajador


Índice de frecuencia* de accidentes de trabajo mortales. España y Región de Murcia, 1995-2003									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Murcia	5,8	9,0	7,4	6,8	5,1	3,9	5,7	4,4	4,6
España	5,6	5,6	5,8	5,8	5,4	5,3	4,7	4,8	4,4

*Número de accidentes mortales por 100 millones de horas-hombre trabajadas



- El índice de accidentes de trabajo en Murcia sigue una tendencia creciente hasta el año 1999 (aumenta en un 2%), siendo superior al total nacional hasta el 2003 en que es ligeramente inferior. A partir de 1999 sigue una tendencia decreciente disminuyendo en un 41% entre 2000 y 2003.
- El índice de accidentes mortales en 2003 es similar al total nacional, sigue una tendencia decreciente entre 1996 y 2000 (desciende en un 33%) con un repunte en 2001 para, a partir de este año, experimentar de nuevo una ligera disminución.

Figura 3.5.- Evolución del número de víctimas de accidentes de trabajo por 100.000 habitantes en la UE y en España, 1991-2002.




- En el conjunto de la Unión Europea, España y Luxemburgo representan la tasa más elevada de accidentes de trabajo por 100.000 habitantes en 2002. Esta tasa sigue en España una tendencia creciente entre 1991 y 2002, al contrario de lo que ocurre en el resto de países de la Unión Europea.


4. INCAPACIDAD

4.1. Incapacidad permanente¹.

Población con alguna discapacidad. Tasa ajustada por edad por 1000 habitantes. España y Región de Murcia, 1999			
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
Murcia	116,6	120,2	111,3
España	89,9	93,2	84,8



Número de pensiones por incapacidad permanente en el Sistema de Seguridad Social en menores de 65 años por 100.000 trabajadores afiliados al sistema. España y Región de Murcia, 1998-2004							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Murcia	86	77,2	71	65,7	60,8	57,1	55,6
España	59,6	52,3	49,1	48,2	42,9	46,3	45,1





- Murcia es la comunidad autónoma, junto con Andalucía, con una mayor prevalencia de discapacidad en 1999 (un 30% superior al total nacional). Al igual que en el total nacional es algo superior en varones.
- Tras Asturias Andalucía y Extremadura, Murcia está entre las comunidades autónomas con una tasa más elevada de pensiones por incapacidad permanente en menores de 65 años (un 23% superior al total nacional) en el año 2004.
- La tendencia descendente, mayor en Murcia, ha acortado diferencias con España.

¹ Los datos han sido extraídos de la Encuesta sobre Discapacidades y Estado de Salud de 1999.

4.2. Restricción temporal de la actividad¹.

Número de días de restricción de actividad principal y número de días de cama por persona y año ajustado por edad (población mayor de 16 años). España y Región de Murcia, 2003						
	Ambos sexos		Varones		Mujeres	
	Restricción de actividad principal	Cama	Restricción de actividad principal	Cama	Restricción de actividad principal	Cama
Murcia	20,6	5,6	12,4	4,7	28,8	6,7
España	19,1	6,5	15,4	5,2	22,4	7,6



- La restricción de actividad en la mujeres murcianas mayores de 26 años es más del doble que en los hombres.
- La diferencia entre géneros es mucho menos en España. La razón mujer:hombre es 2,3 y 1,5 en Murcia y España, respectivamente.
- El número de días en cama es también mayor en las mujeres que en los varones, pero respecto al total nacional es ligeramente inferior en ambos casos.

¹ Los datos han sido extraídos de la Encuesta Nacional de Salud 2003.

5. PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LA SALUD¹

Autovaloración del estado de salud. Distribución porcentual. Población de 16 y más años. España y Región de Murcia, 1993-2003										
	1993					2003				
	Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo	Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
Murcia	16,8	52,9	22,3	6,6	1,5	12,7	56,3	22,3	6,1	2,6
España	10,9	57,6	24,4	6	1,1	11,2	56,8	23,2	6,7	2,2





Figura 4.5.- Porcentaje de población que valora su salud como buena o muy buena, según comunidad autónoma. Población de 16 y más años. España, 2003.



- La prevalencia de personas que declaran un estado de salud bueno o muy bueno en la región no experimenta variaciones importantes entre 1993 y 2003 y en ambos años es muy similar al total nacional.

Tabla 4.2.- Porcentaje de población que valora su salud como buena o muy buena en diversos países de la UE en 2002 y cambio en el porcentaje desde 1994.

	2002	Cambio en el porcentaje desde 1994
Eslovaquia	66,2	21,2
Francia	77,4	13,4
República Checa	54,8	8,9
Luxemburgo	72,9	6,4
Letonia	32,5	6,3
Italia	63,3	3,3
Bélgica	74,3	0,8
Países miembros de la UE en 2004	68,4	0,5
Estonia	35,9	0,2
Dinamarca	79,0	-0,2
España	61,7	-2,7
Alemania	64,8	-4,6
Finlandia	54,7	-12,2
Portugal	39,3	-13,7
Grecia	50,9	-24,6

Sin datos: Austria, Chipre, Hungría, Irlanda, Lituania, Malta, Holanda, Polonia, Eslovenia, Suecia y Reino Unido

¹ Los datos han sido extraídos de la Encuesta Nacional de Salud 2003.

6. SALUD MATERNO INFANTIL

6.1. Mortalidad infantil¹.

6.1.1. Mortalidad infantil.

Tasa de mortalidad infantil. UE, España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	6,8	4,9	7,8	6,2	5,9	7,3	6,8	5,5	6,2
España	7,6	5,5	5,5	5	4,9	4,5	4,4	4,1	4,1
Unión Europea (antes de 2004)									4,6





Figura 5.1.- Tasa de mortalidad infantil. Países de la UE, 2002.



- La mortalidad infantil en la Región de Murcia es más elevada que en el total nacional y que en el conjunto de los países de la Unión Europea. A diferencia de la tasa de mortalidad infantil en España, que ha seguido una tendencia descendente entre 1990 y 2002, en Murcia ha seguido una tendencia variable a lo largo de todo el periodo.
- Murcia constituye la Comunidad Autónoma con una mayor tasa de mortalidad infantil después de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

¹ Defunciones de los niños menores de un año de vida.

6.1.2. Mortalidad neonatal¹.

Tasa de mortalidad neonatal. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	4,3	3,2	5,6	3,9	3,4	5	3,4	4	4,2
España	5	3,5	3,5	3,2	3	2,8	2,8	2,8	2,8




Figura 5.2.- Tasa de mortalidad neonatal. Países de la UE, 2002.



- La mortalidad neonatal es un 33% más elevada en Murcia que en el total nacional en 2002, constituyendo la cuarta comunidad autónoma con una tasa más elevada.
- Ha seguido una tendencia variable a lo largo del periodo y no una reducción paulatina como en el caso nacional.

¹ Defunciones de los niños menores de 28 días de vida.

6.1.3. Mortalidad posneonatal¹.

Tasa de mortalidad posneonatal. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	2,5	1,8	2,2	2,2	2,4	2,3	3,5	1,5	2
España	2,6	2	2	1,8	1,9	1,7	1,6	1,3	1,4




Figura 5.3.- Tasa de mortalidad postneonatal. Países de la UE, 2002.



- La mortalidad postneonatal en 2002 es en Murcia superior al total nacional y constituye la comunidad autónoma con mayor tasa en 2002.

¹ Defunciones de los niños con 28 o más días de vida y con menos de un año.

6.1.4. Mortalidad perinatal¹.

Tasa de mortalidad perinatal. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	8,4	6,8	7,8	7,6	6,9	8,6	5,5	5,7	6,3
España	7,6	6	6,4	6,3	5,9	5,7	5,5	5,6	5,4




Figura 5.3.- Tasa de mortalidad perinatal, según comunidad autónoma. España, 2002.




Figura 5.4.- Tasa de mortalidad perinatal. Países de la UE, 2002.





- Murcia constituye la sexta comunidad autónoma con una mayor tasa de mortalidad perinatal en 2002, su tasa es algo superior al total nacional y ha seguido entre 1990 y 2002 una tendencia variable alcanzando su punto más alto en 1999, a diferencia de la tendencia decreciente seguida en la tasa nacional.

¹ Defunciones fetales tardías (nacidos muertos) y defunciones de recién nacidos antes de la semana de vida.

6.1.5. Nacimientos según la edad de la madre.

Nacidos vivos de madres menores de 20 años. Porcentaje sobre el total de nacidos vivos. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	6,4	4,7	4,7	4,7	4,6	4,6	4,3	4,9	4,2
España	4,8	3,3	3,1	3,1	3	3	2,9	2,9	2,9


Nacidos vivos de madres de 35 y más años. Porcentaje sobre el total de nacidos vivos. España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	10,5	12,8	13,7	14,8	15,6	16,8	17,1	18	19,2
España	10,4	13,8	14,8	16	17,3	18,7	19,6	20,8	22,2



- La prevalencia de niños nacidos de madres menores de 20 años se ha ido reduciendo paulatinamente entre 1990 y 2002, tanto en el total nacional como en la región, aunque es más elevada en Murcia a lo largo de todo el periodo. Junto con Andalucía, Canarias y Ceuta se encuentra entre las comunidades autónomas con una prevalencia más elevada.
- Los niños nacidos de madres mayores de 35 años han aumentado a lo largo del mismo periodo, siendo su prevalencia en 2002 algo más elevada en Murcia que en el total nacional.

6.1.6. Nacimientos según el peso del recién nacido.


Porcentaje de nacidos vivos con un peso de 2.500 gramos o más. UE, España y Región de Murcia, 1990-2002									
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	95,4	95,1	94,7	94,4	94,8	93,8	93,4	93,1	93
España	94,8	94	93,9	93,7	93,5	93,2	93,1	92,8	92,5
Unión Europea (países antes de 2004)									93,4
Unión Europea (países incorporados 2004)									93,6



- El porcentaje de niños cuyo peso al nacer es de 2.500 gramos o más es similar en Murcia al total nacional y al del resto de países de la Unión Europea (aunque ligeramente superior al primero e inferior a los segundos).

6.1.7. Lactancia materna.

Porcentaje de niños alimentados total o parcialmente con lactancia materna a las 6 semanas 3 meses y 6 meses. España y Región de Murcia, 2001			
	6 semanas	3 meses	6 meses
Murcia	90,5	73,9	54,9
España	78,6	65,5	44,9



- El porcentaje de niños alimentados total o parcialmente con lactancia materna es más elevado en el caso de Murcia tanto a las 6 semanas como a los 3 y 6 meses.

6.1.8. Interrupción voluntaria del embarazo.

Número de interrupciones voluntarias del embarazo por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España y Región de Murcia, 1995-2003									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Murcia	4	4,3	4,6	4,9	5,6	8	9,7	11,5	11,7
España	5,5	5,7	5,5	6	6,5	7,1	7,7	8,5	8,8




Figura 5.6.- Número de interrupciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, según comunidad autónoma. España, 2003.




Figura 5.6.- Evolución del número de interrupciones voluntarias del embarazo por 1000 nacidos vivos en la UE y en España, 1990-2002.










Figura 5.5.- Interrupciones voluntarias del embarazo por 1000 nacidos vivos. Países de la UE, 2002.



- Las interrupciones voluntarias del embarazo se han más que duplicado en el caso de Murcia entre 1995 y 2003, siendo su tasa por 1.000 mujeres de 15 a 44 años superior al total nacional desde 2000.
- En 2003 junto con Madrid Baleares y Cataluña se encuentra entre las tasas más altas.



6.1.9. Vacunación infantil.





7. HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA¹

7.1. Consumo de tabaco.

Porcentaje ajustado por edad de población fumadora por sexo. Población de 16 y más años. España y Región de Murcia, 1993-2003						
	Ambos sexos		Varones		Mujeres	
	1993	2003	1993	2003	1993	2003
Murcia	40,2	31,2	54,5	40,5	26,6	22,4
España	36,5	31,3	48,3	37,5	25,7	25,6



Porcentaje ajustado por edad de población gran fumadora (20 y más cigarrillos/día). Población de 16 y más años. España y Región de Murcia, 1993-2003						
	Ambos sexos		Varones		Mujeres	
	1993	2003	1993	2003	1993	2003
Murcia	17,3	14,4	27,3	22,3	7,5	6,5
España	16	13,2	24,5	18,6	8	7,9



➤ La prevalencia de personas que fuman se ha reducido entre 1993 y 2003 tanto en la Región de Murcia como en España. El principal descenso se ha llevado a cabo en los hombres, donde las prevalencias son mayores. Las tasas son, sin embargo, mayores en hombres de la Región de Murcia que en España en los dos años estudiados (3% en 1993 y 4% en 2003).

➤ Entre 1993 y 2003 se han reducido las tasas de grandes fumadores (20 y más cigarrillos/día) tanto en la Región de Murcia como en España. Sin embargo, las tasas se mantienen por encima de la media en los hombres de la Región de Murcia (4% en 2003).

¹ Datos extraídos de la Encuesta Nacional de Salud 2003.

7.2. Consumo de alcohol.

Porcentaje ajustado por edad de población no consumidora de alcohol. Población de 16 y más años. España y Región de Murcia, 1993-2003						
	Ambos sexos		Varones		Mujeres	
	1993	2003	1993	2003	1993	2003
Murcia	38,5	43,7	27,2	31,9	49,3	55
España	37,2	43,2	23,9	30,8	49,2	54,8






Figura 6.6.- Porcentaje ajustado por edad de población no consumidora de alcohol, según comunidad autónoma. Población de 16 y más años. España, 2003.



➤ En la década que va de 1993 a 2003 ha aumentado la proporción de personas abstemias de ambos sexos tanto en la Región de Murcia como en España. Las tasas son muy similares para ambos ámbitos geográficos.

Porcentaje ajustado por edad de bebedores excesivos *. Población de 16 y más años. España y Región de Murcia, 1993-2003						
	Ambos sexos		Varones		Mujeres	
	1993	2003	1993	2003	1993	2003
Murcia	6,4	8,2	12,1	15	1	1,5
España	7,1	2,5	13,6	4,5	1	0,6


*Individuo que declara beber más de 50cc de alcohol absoluto al día



➤ Mientras en 1993 las tasas de hombres bebedores excesivos (declaran beber más de 50cc de alcohol absoluto al día) eran similares en la Región de Murcia y en España, en 2003 se ha abierto una brecha en el sentido de una importante reducción mientras que en la Región de Murcia se observa un ligero aumento. Ésta conducta es prácticamente inexistente en mujeres.


7.3. Consumo de otras drogas.

Casos de admisiones a tratamiento ambulatorio debido a consumo de sustancias psicoactivas por 100.000 habitantes de 15 a 64 años de edad. España y Región de Murcia, 1996-2002.							
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	178,9	151,5	151,7	154,2	168,7	157,7	206,1
España	197,3	195	201,5	189	181,3	179,3	168,7



- En el periodo 1996-2002 las tasas de admitidos a tratamiento por sustancias psicoactivas en España tiene un patrón distinto al de la Región de Murcia, mientras que en España desde el año 1998 se produce un descenso paulatino en el número de casos, en la Región se produce un aumento ligero pero que se incrementa de forma importante en el año 2002 superando las tasas de España.

Casos de admisiones a tratamiento ambulatorio debido a consumo de opiáceos o cocaína por 100.000 habitantes de 15 a 64 años de edad. España y Región de Murcia, 1996-2002.							
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Murcia	170,1	145,5	143,7	142,2	160,5	146,9	191,5
España	188	182,9	186,7	174,2	165,7	160,7	145,4



- Las tasas de admitidos a tratamiento por opiáceos o cocaína tienen un patrón igual que en las demandas de todas las sustancias psicoactivas, debido a que la mayoría de los casos son por opiáceos o cocaína.

7.4. Actividad física.

Porcentaje ajustado por edad de población sedentaria en tiempo libre. Población de 20 y más años. España y Región de Murcia, 1993-2003						
	Ambos sexos		Varones		Mujeres	
	1993	2003	1993	2003	1993	2003
Murcia	60,8	61,9	54	58,8	66,5	64,8
España	54,7	58,5	47,4	54,4	61,6	62,5






Figura 6.8.- Porcentaje ajustado por edad de población sedentaria, según comunidad autónoma. Población de 16 y más años. España, 2003.



- Globalmente la proporción de personas sedentarias en el tiempo libre observada en la Región de Murcia 1993 se mantiene en 2003 aunque por sexos el comportamiento es diferente con un aumento de cinco puntos en hombres y de dos en mujeres.
- Este aumento selectivo se observa también en los hombres del resto de España (7 puntos de incremento).
- Para cada sexo y año las tasas de sedentarismo en el tiempo libre son superiores en la Región de Murcia.

7.5. Obesidad.

Porcentaje ajustado por edad de población con índice de masa corporal >30 Kg./m2. Población de 20 y más años. España y Región de Murcia, 1993-2003						
	Ambos sexos		Varones		Mujeres	
	1993	2003	1993	2003	1993	2003
Murcia	12,2	16,9	11,7	16,2	13	17,2
España	10,2	13,7	9,7	13,6	10,8	13,6





Tabla 6.4 - Prevalencia de obesidad (IMC \geq 30 kg/m2) en hombres y mujeres de los países de la Unión Europea (1994-2002).

	Hombres	Mujeres
Italia	9,5	9,9
Letonia	9,5	17,4
Estonia	9,9	15,3
Austria	10,0	14,0
Suecia	10,0	11,9
Polonia	10,3	12,4
Holanda	10,4	10,1
Francia	11,4	11,3
Lituania	11,4	18,3
Dinamarca	12,5	11,3
España	13,7	14,3
Portugal	13,9	26,1
Belgica	14,0	13,0
Luxemburgo	15,3	13,9
Eslovenia	16,5	13,8
Eslovaquia	19,3	18,9
Finlandia	19,8	19,4
Irlanda	20,1	19,9
Hungría	21,0	21,2
Malta	22,0	35,0
Reino Unido	22,2	23,0
Alemania	22,5	23,3
República Checa	24,7	26,2
Chipre	26,6	23,7
Grecia	27,5	38,1

➤ La prevalencia de obesidad ha aumentado tanto en la Región de Murcia como en España en los diez años que van de 1993 a 2003 (5 puntos en Murcia y 3,5 en España). El incremento se observa en ambos sexos pero es ligeramente superior en hombres. Con respecto a España las tasas en la Región de Murcia son más elevadas para cada sexo y año estudiado.

➤ En el contexto europeo España se mantiene en una posición intermedia por encima de países como Francia o Italia pero con cifras inferiores que la mayoría de los países recientemente integrados en la UE y de otros, como Inglaterra o Alemania, en la UE antes de 2004. Los datos de peso y talla para España son autoinformados y no medidos.