

Tabla 1. Primeras causas de mortalidad. Región de Murcia, 1997.

Hombres

Causas	Casos	%	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	578	12,2	106,35
Enfermedades cerebrovasculares	456	9,6	83,90
Cáncer broncopulmonar	390	8,2	71,76
EPOC y afines	360	7,6	66,24
Cirrosis hepática y otras	148	3,1	27,23
Accidentes de vehículos a motor	143	3,0	26,31
Cáncer de próstata	127	2,7	23,37
Cáncer de estómago	95	2,0	17,48
Cáncer de intestino grueso	94	2,0	17,30
Diabetes	84	1,8	15,46
Resto de causas	2263	47,8	416,38
Total	4738	100,0	871,76

Tasa específica por 100.000 hombres.

Mujeres

Causas	Casos	%	Tasa
Enfermedades cerebrovasculares	673	16,3	120,53
Enfermedades isquémicas del corazón	403	9,8	72,17
EPOC y afines	145	3,5	25,97
Cáncer de mama	143	3,5	25,61
Diabetes	130	3,2	23,28
Cáncer de intestino grueso	96	2,3	17,19
Entidades mal definidas	96	2,3	17,19
Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis	89	2,2	15,94
Enfermedades hipertensivas	80	1,9	14,33
Enf. del sist. nervioso y de los órg. de los sentidos	73	1,8	13,07
Arteriosclerosis	58	1,4	10,39
Resto de causas	2139	51,9	383,07
Total	4125	100,0	738,74

Tasa específica por 100.000 mujeres.

son las principales causas de muerte, seguidas de los accidentes (14,3%), las neoplasias (7,1%), y las enfermedades del sistema nervioso (7,1%).

De 15 a 64 años, la mayor contribución la presentan las neoplasias (40,0%), las enfermedades cardiocirculatorias (20,7%) y los accidentes (17,6%).

Mayores de 64 años, predomina la mortalidad por enfermedades del aparato cardiocirculatorio (42,9%), seguida de las neoplasias (22,2%), de las enfermedades respiratorias (12,2%), y de las causas digestivas (4,8%).

Mortalidad por causas específicas

Las enfermedades cerebrovasculares y las isquémicas del corazón son las dos primeras causas específicas de mortalidad en ambos sexos (tabla 1). La enfermedad isquémica del corazón es la primera causa de muerte en los hombres y la enfermedad cerebrovascular en las mujeres. En tercer lugar se encuentra el cáncer broncopulmonar en los hombres y la enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC) y afines en las mujeres. Se sitúa en la cuarta posición la enfermedad obstructiva crónica (EPOC) en hombres y cáncer de mama en mujeres.

ESTADÍSTICAS de mortalidad en la Región de Murcia en 1997

La tasa de mortalidad por todas las causas de las personas residentes en la Región de Murcia (fallecidos en España) es de 8,04 fallecidos por cada mil habitantes, con un total de 8.863 defunciones. La tasa de mortalidad es de 8,7 por mil entre los hombres y de 7,4 por mil en las mujeres.

En los hombres, las principales causas de muerte son las enfermedades cardiocirculatorias (32,4% sobre todas las muertes de su sexo), las neoplásicas (29,8%), y las causas respiratorias (12,1%).

En las mujeres destacan, por su magnitud, las enfermedades del aparato circulatorio (44,9%), las neoplasias (19,7%) y las enfermedades respiratorias (8,6%).

La **esperanza de vida** al nacer es de 78,40 años en la región, siendo mayor en las mujeres (81,97 años) en 7,07 años que en los hombres (74,90 años). La esperanza de vida es siempre mayor en las mujeres respecto a los hombres en todos los grupos quinquenales de edad.

La tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año) es de 6,16 fallecidos por mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad neonatal precoz (nacidos vivos fallecidos con menos de 7 días de vida) es de 3,00 por mil, y la tasa del periodo posneonatal (fallecidos entre los 28 días y menos de 1 año de vida) es de 2,23 por mil nacidos vivos.

Mortalidad proporcional por grupos de edad

De 0 a 14 años, las anomalías congénitas (32,5%) y enfermedades del periodo perinatal (25,4%)

Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria
Semanas 33 a 36 (del 15 de agosto al 11 de septiembre de 1999). Distribución semanal

Enfermedades		Casos notificados											Casos acumulados			
		Semana 33			Semana 34			Semana 35			Semana 36		Semanas 1 a 36			
		1999	1998	Mediana	1999	1998	Mediana	1999	1998	Mediana	1999	1998	Mediana	1999	1998	Mediana
Gripe	1980	24	64	94	34	51	135	48	107	147	120	133	199	142.239	100.228	68.878
Tuberculosis respiratoria	1980	1	6	3	1	2	3	2	2	3	0	3	3	79	106	146
Meningitis tuberculosa	1997	0	0		0	0		0	0		0	0		2	1	
Otras tuberculosis	1986	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	16	21	24
Legionelosis	1997	0	0		1	0		0	0		0	1		7	15	
Hepatitis A	1997	0	1		0	0		0	1		2	1		35	74	
Hepatitis B	1997	0	0		0	0		0	0		1	0		6	15	
Otras hepatitis vírica	1997	0	1		0	0		1	0		0	0		12	16	
Fiebres tifoidea y par.	1980	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	9	10	14
Toxiinfecciones-Alimen.	1983	8	3	6	16	13	13	3	1	3	5	19	8	264	279	317
Varicela	1980	30	14	34	18	11	28	15	13	18	17	11	12	10.376	6.088	7.511
Sarampión	1980	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12	9	42
Rubeola	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	11	19	74
Parotiditis	1980	0	1	1	3	0	1	1	0	0	1	1	0	41	113	33
Tosferina	1980	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	13	12	12
Enfermedad meningocóc.	1980	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	40	25	25
Otras meningitis	1986	3	0	1	0	1	1	0	1	0	0	3	1	38	38	33
Sífilis	1982	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	10	21	18
Infección gonocócica	1982	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	13	12	13
Fiebre exantemática me.	1981	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1	0	0	13	7	7
Brucelosis	1980	0	0	1	1	5	3	0	1	1	0	2	0	21	34	65
Tétanos	1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Poliomielitis	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

La mediana se calcula sobre el último quinquenio; no se incluyen las enfermedades sin casos notificados en año actual.

Porcentaje de declaración (*)
Semanas 33 a 36 (del 15 de agosto al 11 de septiembre de 1999)

Municipios	Población (Proyec. 1997)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1997)	% de declaración
Abanilla	4.921	87,5	Calasparra	8.601	75,0
Abarán	12.462	100,0	Campos del Río	1.823	0,0
Águilas	28.662	95,6	Caravaca de la Cruz	19.512	91,7
Albudeite	1.261	100,0	Cartagena	168.649	100,0
Alcantarilla	36.304	97,2	Cehegín	11.706	87,5
Aledo	897	75,0	Ceutí	7.358	100,0
Alguazas	7.846	90,0	Cieza	32.339	75,0
Alhama de Murcia	14.920	100,0	Fortuna	5.925	100,0
Archena	14.447	52,5	Fuente Álamo de Murcia	7.608	100,0
Beniel	8.859	100,0	Jumilla	19.268	64,6
Blanca	5.386	100,0	Librilla	3.877	91,7
Bullas	9.988	100,0	Lorca	67.277	95,1

(*) Num. partes de declaración/numeros recibidos / Num. de médicos de atención primaria en las cuatro semanas.

Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria
Semanas 33 a 36 (del 15 de agosto al 11 de septiembre de 1999). Distribución semanal

	Áreas de Salud												REGIÓN	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		TOTAL	
Población	468.966		262.079		129.892		57.304		48.469		161.062		1.127.772	
	Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.	
Enfermedades														
Gripe	64	52.160	28	27.471	87	23.580	0	7.056	15	4.880	32	27.092	226	142.239
Tuberculosis respiratoria	2	34	1	21	0	8	0	1	0	1	1	14	4	79
Meningitis tuberculosa	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Otras tuberculosis	0	6	1	6	0	2	0	0	0	0	0	2	1	16
Legionelosis	0	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
Hepatitis A	2	24	0	5	0	3	0	0	0	0	0	3	2	35
Hepatitis B	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6
Otras hepatitis víricas	1	5	0	4	0	1	0	0	0	1	0	1	1	12
Fiebres tifoidea y paratifoidea	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Toxiinfecciones-alimentarias	3	106	20	77	4	20	0	8	0	6	5	47	32	264
Varicela	13	3.050	16	3.328	7	1.371	4	215	21	977	19	1.435	80	10.376
Sarampión	0	2	0	4	0	0	0	4	0	1	1	1	1	12
Rubeola	1	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11
Parotiditis	2	16	2	16	1	6	0	0	0	1	0	2	5	41
Tosferina	1	4	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	1	13
Enfermedad meningocócica	1	17	0	10	1	4	0	3	0	1	0	5	2	40
Otras meningitis	1	10	1	17	0	4	0	0	0	4	1	3	3	38
Sífilis	0	2	0	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	10
Infección gonocócica	1	7	0	3	0	1	0	0	0	0	1	2	2	13
Fiebre exantemática Mediterránea	0	2	2	3	2	7	0	1	0	0	0	0	4	13
Brucelosis	0	4	0	4	1	7	0	2	0	3	0	1	1	21
Tétanos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Poliomielitis	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Los datos incluyen las enfermedades sin casos notificados en año actual.

Porcentaje de declaración (*)
Semanas 33 a 36 (del 15 de agosto al 11 de septiembre de 1999)

Municipios	Población (Proyec. 1997)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1997)	% de declaración
Lorquí	5.507	100,0	Torre Pacheco	18.508	63,5
Mazarrón	17.370	100,0	Torres de Cotillas, Las	16.618	41,7
Molina de Segura	43.329	57,0	Totana	22.038	100,0
Moratalla	7.497	84,4	Ulea	1.011	75,0
Mula	13.217	90,9	Unión, La	13.012	100,0
Murcia	375.577	70,8	Villanueva del Río Segura	1.578	37,5
Ojós	730	25,0	Yecla	29.201	96,9
Pliego	3.207	50,0	Santomera	9.921	97,2
Puerto Lumbreras	11.018	100,0	Alcázares, Los	5.612	91,7
Ricote	1.605	25,0			
San Javier	17.025	100,0	Total Región	1.127.772	83,8
San Pedro del Pinatar	14.295	100,0			

Años potenciales de vida perdidos (APVP)

El indicador años potenciales de vida perdidos expresa una aproximación a la mortalidad prematura, que es en la Región de Murcia de 14,63 años menos por persona residente fallecida. Los hombres representan el 71,68% de la mortalidad precoz y las mujeres el 28,32% restante.

Las causas de mortalidad específica que restan más años de vida son, en los hombres, los accidentes de tráfico (9,97% sobre el número total de APVP), la enfermedad isquémica del corazón (5,40%), y los suicidios y autolesiones (5,21%). En las mujeres son el cáncer de mama (2,94%), accidentes de tráfico (2,92%) y los suicidios-autolesiones (1,33%).

Áreas de salud

Al comparar la mortalidad general de las áreas de salud con el conjunto regional, observamos mayor mortalidad en el área de Cartagena y menor mortalidad en La Vega del Segura (mapa 1).

En el **área de salud de Murcia** se observan menos defunciones por enfermedades hipertensivas y por suicidios y autolesiones

En el **área de Cartagena**, el exceso de mortalidad se manifiesta tanto en los hombres como en las mujeres. Las defunciones por enfermedades neoplásicas, las cardiovasculares e inmunitarias están aumentadas en su conjunto. Este aumento es también estadísticamente significativo en las mujeres en las dos primeras grandes causas antes mencionadas. Por causas específicas, en este área destaca la sobremortalidad por enfermedades isquémicas cardíacas e hipertensivas en hombres y enfermedades de la circulación pulmonar, reumáticas cardíacas y pericárdicas en las mujeres.

El **área de salud de Lorca** presenta menor mortalidad en las mujeres. En cuanto a causas específicas, presenta menos defunciones por trastornos mentales en las mujeres que en la región, al igual que por neumonía, si bien están aumentando los fallecimientos por ahogamiento.

El **área del Noroeste** presenta una menor mortalidad por enfermedades endocrino-metabólicas-

inmunitarias en las mujeres, y por problemas óseo-musculares y por enfermedades neoplásicas en los hombres.

En el **área del Altiplano**, las enfermedades respiratorias presentan un exceso de muertes significativo, que se concreta en la EPOC y en las enfermedades cerebrovasculares en el hombre. En las mujeres, se registra una menor mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón.

En **La Vega del Segura – Comarca Oriental** se manifiesta una menor mortalidad general y en el

sexo masculino. También está disminuida la mortalidad por cáncer de mama en la mujer. Además presenta un mayor número de fallecimientos por cáncer de hígado (en el total y para los hombres) y por tumores uterinos distintos del de cérvix, así como por enfermedad arteriosclerótica en ambos sexos y por neumonía.

José García Rodríguez
Lluís Cirera Suárez
Servicio de Epidemiología
D.G. de Salud Pública
Consejería de Sanidad y Consumo

Mapa 1. Comparación de la mortalidad general de las áreas de salud con el total regional. Ambos sexos. Región de Murcia. 1997.




Gráfico 1. Mortalidad proporcional por grandes grupos de causas. Ambos sexos. Región de Murcia. 1997.

