

Consumo de  
opiáceos y cocaína  
en la Región de  
Murcia, 1994.

El Sistema de Información sobre Toxicomanías (SITCAM) recoge información sobre tres indicadores indirectos, que son: el indicador admisión a tratamiento (personas admitidas a tratamiento por opiáceos o cocaína en los centros ambulatorios)<sup>(1)</sup>, el indicador urgencias hospitalarias (episodios de urgencias por opiáceos o cocaína en los hospitales monitorizados) y el indicador mortalidad (número de fallecimientos provocados por reacción aguda tras el consumo de opiáceos o cocaína en los municipios monitorizados) en la Región de Murcia.

Indicador admisión a  
tratamiento

El número total de casos admitidos a tratamiento por consumo de opiáceos o cocaína ha sido de 1.200, incrementándose en un 9% respecto del año 1993. Las características generales de los casos admitidos a tratamiento<sup>(2)</sup>, según hayan realizado tratamiento previo, o sea, el primer tratamiento, se presentan en la Tabla 1. Del total de los pacientes, el 50.2% habían recibido anteriormente tratamiento por consumo de estas sustancias, mientras que el 47.3% era el primer tratamiento que recibían, siendo el 2.4% los casos en los que se

desconocía si habían estado en tratamiento en ocasiones anteriores.


Las admisiones a tratamiento repetidas por una misma persona, durante el mismo año en la Región, aunque se produzcan en centros de tratamiento distintos, son eliminados.

**Características generales de todos los casos admitidos a tratamiento**

Los centros de tratamiento están representados en la Gráfica 1, con el número de pacientes que atendieron durante este período. Ha existido un incremento en las

	(TODOS)	(PT)	(TP)
NUMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS	1.200	568	603
DROGAS PRIMARIAS QUE INICIAN LOS TRATAMIENTOS (%)			
Heroína	92.67	90.49	94.69
Cocaína	7.00	9.33	4.81
Metadona	-	-	-
Otros opiáceos	0.33	0.17	0.49
SEXO (%)			
Hombres	87.31	87.85	86.86
Mujeres	12.69	12.15	13.14
EDAD MEDIA (AÑOS)	26.46	25.53	27.22
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO	20.07	20.65	19.54
NUMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO	6.41	4.90	7.74
NUMERO DE DROGAS CONSUMIDAS (%)			
Cinco o más	3.52	4.55	2.48
Cuatro	10.91	12.36	9.75
Tres	21.55	22.73	20.74
Dos	30.17	24.18	36.52
Una	33.86	36.18	30.50
VIA DE ADMINISTRACION DE LA DROGA PRINCIPAL (%)			
Oral	0.16	0.35	-
Fumada	29.67	41.20	20.07
Inhalada	1.50	1.76	1.00
Inyectada	57.50	44.37	70.15
Esnifada	7.58	10.92	4.31
Otras	-	-	-
Desconocida	3.58	1.40	4.48

**Gráfica 1. Distribución de los casos de consumo de drogas secundarias por centros de tratamiento en la Región de Murcia.**



admisiones en: el CSM de Lorca del 152%, en el CAD de Murcia del 18% y en el CSM de Cartagena del 9% respecto del año 1993, mientras que en el Programa de Prisiones se observó un descenso del 19% de las admisiones a tratamiento.

La droga principal por la que se demanda tratamiento, respecto del año 1993, se ha modificado ligeramente en porcentaje, aumentando los pacientes que demandan tratamiento por heroína del 91% al 92.7%, siendo los valores absolutos de 1.001 casos en el 93 y de 1.112 casos en el 94; los consumidores de cocaína se mantienen en el 7%, correspondiendo en casos a 84.

La distribución por sexo, en el 87.3% de los casos corresponde a hombres, siendo dos puntos inferior al año 93.

La edad media de estos pacientes cuando demandan tratamiento es de 26.5 años, siendo la edad media al iniciar el consumo de la droga principal de 20.1 años y el número medio de años de consumo de 6.4.

Por grupos de edad, el 82% de todas las admisiones a tratamiento se encuentran entre los 20 y 34 años.

El inicio en el consumo de cocaína se produce a mayor edad que el de heroína (22.8 y 19.8 años, respectivamente). También los consumidores de cocaína demandan tratamiento a una edad más alta que los de heroína. Sin embargo, el tiempo que tardan en demandar tratamiento los consumidores de cocaína es algo menor que el de los consumidores de heroína (6 y 6.4 años, respectivamente).


El número de drogas secundarias consumidas al demandar tratamiento, para los pacientes que consumían tres o más drogas ha descendido del 50.5% al 36%. Este descenso del policonsumo se empezó a observar en el año 1991.

La vía de administración de la droga principal se ha distribuido de la siguiente forma: la inyectada en el 57.5% de los consumidores, la fumada en el 29.7%, la esnifada en el 7.6% y la inhalada en el 1.5%. Ha existido un descenso de los usuarios de la vía inyectada y un aumento de la vía fumada (Gráfica 2).


Según las drogas consumidas en los 30 días anteriores a las demandas de tratamiento por cocaína se observa que las drogas más usadas en estos pacientes son en primer lugar el cannabis y el alcohol y en tercer lugar las anfetaminas.

Los porcentajes de otras drogas consumidas en los 30 días anteriores, en los inicios de tratamiento por heroína, al comparar los pacientes que habían realizado tratamiento previo respecto a los que son el primer tratamiento, se observa que en los pacientes que demandan tratamiento por primera vez es menor el porcentaje que consume

**Gráfica 2. Vías de administración de la droga principal en los pacientes con consumo de drogas secundarias.**



**Indicador urgencias hospitalarias**



El número de urgencias hospitalarias por opiáceos o cocaína en los hospitales monitorizados han sido de 1.213 episodios, incrementándose en un 9% respecto del año 1993.

Con relación al tipo de droga por la que se producen las urgencias, ha descendido el porcentaje de pacientes que acuden por heroína respecto del año anterior del 48% al 38%. Los casos de cocaína se han mantenido en el mismo porcentaje. Respecto de la metadona ha aumentado del 6% al 12%: los casos en los que en la historia clínica de urgencias no consta el tipo de droga que motiva la urgencia suponen el 45%.

Según el sexo, el 82% de los episodios se ha producido en hombres.

La distribución por motivo de consulta (Gráfica 5) ha descendido el síndrome de abstinencia, las sobredosis se han incrementado ligeramente, los problemas orgánicos han aumentado del 23% al 35% y los problemas psicopatológicos del 2% al 6% respecto del año 1993.

El 84% de los episodios de urgencias se producen en la condición legal de "no detenido".

(sigue pág. 84)

cocaína, mientras que es mayor el consumo de alcohol y cannabis (Gráfica 3).


Las diferencias entre los pacientes que han realizado tratamiento por primera vez, frente a los que han realizado tratamientos anteriores, es que hay mayor número de coleccionistas (9.3% frente a 4.8%); llevan menos años consumiendo la droga principal 4.9 frente a 7.7 años la vía de administración de la droga principal, en el 44% se la inyectan frente al 70% y el 41% la fuman frente al 20%.

La tasa global de admisiones a tratamiento durante 1994 en la Región de Murcia fue de 110 casos por 100.000 habitantes. La tasa trunca para el grupo de edad entre 15-39 años, de 265.6 casos por 100.000 habitantes<sup>(6)</sup>.

La tasa global de admisiones a tratamiento para España en 1993 fue de 100.4 casos por 100.000 habitantes y la tasa trunca para el grupo de 15-39 años de 254.1 casos por 100.000 habitantes, utilizando la población de derecho del "Censo de población y vivienda 1991, Muestra avance. Principales resultados"<sup>(6)</sup>. Las tasas por Área de Salud de los pacientes admitidos a trata-

miento durante el año 1994 se presentan en la Gráfica 4, siendo el Área de Salud II de Cartagena la que tiene una tasa mayor, 163.1 por 100.000 habitantes, seguida del Área V del Altiplano con 139.1, el Área I de Murcia con 101.4, el Área VI con 93.8, el Área III con 87.9, y la más baja el Área IV del Noroeste con 10.

Gráfica 4. Tasa anual de admisiones a tratamiento por consumo de drogas en la Región de Murcia durante el año 1994



Enfermedades	Casos notificados												Casos acumulados		
	Semana 41			Semana 42			Semana 43			Semana 44			Semanas 01 a 44		
	1994	1993	Mediana	1994	1993	Mediana	1994	1993	Mediana	1994	1993	Mediana	1994	1993	Mediana
Fiebre tifoidea y Paratif.	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	22	19	39
Disentería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	1
Toxi-Infec. alimentarias	14	15	15	0	12	10	145	0	2	5	9	4	579	379	562
Otros procesos diarreicos	1.987	1.643	1.504	1.801	1.733	1.723	1.925	1.761	1.598	1.823	1.630	1.630	84.997	77.118	77.118
I.R.A. In. Resp. agudas	18.455	18.732	15.620	18.066	19.468	17.957	18.097	18.839	16.918	16.807	17.305	16.124	588.422	639.446	557.752
Gripe	956	882	889	915	1.060	1.060	1.338	1.197	1.286	954	1.267	1.397	51.383	70.927	70.927
Neumonía	82	55	44	60	45	53	57	75	50	56	62	59	2.931	3.422	3.158
Tuberculosis respiratoria	3	8	5	1	5	4	2	4	4	0	1	1	192	155	203
Sarampión	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	43	1.289	94
Rubéola	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	97	114	300
Varicela	34	16	11	22	39	32	29	39	32	28	70	34	13.139	7.085	8.666
Escarlatina	2	3	2	3	0	0	2	4	3	1	1	1	89	92	126
Brucelosis	4	0	0	0	1	1	3	0	0	2	1	1	89	66	66
Fiebre exantemática Medit.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7	12	14
Sífilis	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19	26	16
Infección gonocócica	1	0	1	0	1	1	0	0	1	3	0	2	19	40	44
Infección meningocócica	0	0	2	0	0	1	1	1	1	0	1	1	23	41	66
Hepatitis	2	2	3	0	4	4	3	5	5	1	4	4	102	202	260
Fiebre reumática	1	0	2	0	3	2	1	3	2	0	0	1	42	90	90
Parotiditis	0	1	1	2	0	2	3	2	2	4	0	1	69	51	96
Tosferina	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	15	2	8	28	36
Otras meningitis	1	0	2	1	2	2	0	1	2	2	2	2	37	113	105
Otras tuberculosis	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	24	32	26
Otras E.T.S.	17	7	11	23	17	17	17	9	10	13	12	15	601	780	756
Hidatidosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Carbunco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1
Leishmaniasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3

-----

Municipios	Población (Proyec. 1994)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1994)	% de declaración
Abanilla	5.586	100,0	Calasparra	8.649	100,0
Abarán	12.028	100,0	Campos del Río	1.892	75,0
Aguilas	26.119	100,0	Caravaca de la Cruz	20.509	100,0
Albudeite	1.346	100,0	Cartagena	167.447	59,8
Alcantarilla	32.165	100,0	Cehegín	12.803	80,0
Aledo	947	100,0	Ceuti	6.718	93,8
Alguazas	7.226	80,0	Cieza	31.265	98,7
Alhama de Murcia	14.380	100,0	Fortuna	5.945	95,0
Archena	13.773	70,0	Fuente Alamo de Murcia	7.982	107,1
Beniel	7.758	100,0	Jumilla	19.684	75,0
Blanca	5.595	100,0	Librilla	3.788	100,0
Bullas	9.953	100,0	Lorca	66.105	94,5

-----

	Áreas de Salud												REGION	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Total	
Población	430.116		264.174		124.407		60.263		47.587		153.057		1.069.604	
	Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.	
Enfermedades:														
Fiebre tifoidea y Paratif.	1	5	0	6	2	4	0	2	0	3	0	2	3	22
Disenteria	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Toxi-Infec. alimentarias	3	209	17	107	142	192	0	6	0	33	2	32	164	579
Otros procesos diarréicos	2.987	32.568	1.327	17.940	1.007	10.607	573	6.773	674	5.787	878	11.322	7.446	84.997
I.R.A. In. Resp. agudas	28.033	224.217	11.531	109.005	10.216	85.002	6.055	49.474	5.065	36.586	10.525	84.138	71.425	588.422
Gripe	1.726	19.209	404	8.623	933	11.059	233	4.170	147	1.748	720	6.574	4.163	51.383
Neumonía	74	1.104	24	503	86	477	13	170	15	229	43	448	255	2.931
Tuberculosis respiratoria	3	67	3	70	0	8	0	6	0	7	0	34	6	192
Sarampión	1	29	0	6	0	2	0	1	0	0	0	5	1	43
Rubéola	0	40	1	18	0	10	0	5	0	0	0	24	1	97
Varicela	23	6.448	25	2.041	6	2.024	1	933	52	137	6	1.556	113	13.139
Escarlatina	3	51	0	10	0	1	3	10	0	2	2	15	8	89
Brucelosis	2	19	3	22	1	21	1	21	0	3	2	3	9	89
Fiebre exantemática Med.t.	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Sífilis	0	5	0	9	0	0	0	0	0	1	0	4	0	19
Infec. gonocócica	3	9	0	6	0	1	1	1	0	0	0	2	4	19
Infec. meningocócica	0	9	0	7	1	2	0	0	0	0	0	5	1	23
Hepatitis	2	48	3	35	0	8	1	7	0	2	0	2	6	102
Fiebre reumática	2	28	0	4	0	3	0	1	0	0	0	6	2	42
Parotiditis	2	20	0	15	1	8	1	7	0	0	5	19	9	69
Tosferina	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8
Otras meningitis	2	16	2	16	0	1	0	2	0	2	0	0	4	37
Otras tuberculosis	2	16	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	2	24
Otras E.T.S.	12	147	18	139	7	52	0	18	1	47	32	198	70	601
Hidatidosis	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Carbunco	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Leishmaniasis	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Tétanos	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

.....

Lorquí	5.368	100,0	Torre Pacheco	17.187	100,0
Mazarrón	15.502	93,2	Torres de Cotillas, Las	14.945	100,0
Molina de Segura	39.598	70,7	Totana	20.941	98,1
Moratalla	8.349	83,3	Ulea	1.044	75,0
Mula	13.051	90,9	Unión, La	13.519	100,0
Murcia	343.494	76,4	Villanueva del Río Segura	1.623	0,0
Ojos	694	75,0	Yecla	27.903	100,0
Pieago	3.266	58,3	Santomera	8.976	100,0
Puerto Lumbreras	10.295	100,0	Alcázares, Los	4.292	100,0
Ricote	1.649	75,0			
San Javier	15.455	102,8	Total Región	1.069.604	83,6
San Pedro del Pinatar	12.790	100,0			

Enfermedades	Casos notificados										Casos acumulados				
	Semana 45			Semana 46			Semana 47			Semana 48			Semanas 01 a 48		
	1994	1993	Mediana	1994	1993	Mediana	1994	1993	Mediana	1994	1993	Mediana	1994	1993	Mediana
Fiebre tifoidea y Paratif.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	19	43
Disenteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	1
Toxi-Infecc. alimentarias	27	3	4	6	15	3	5	3	3	11	5	9	623	405	569
Otros procesos diarreicos	2.090	1.532	1.560	2.178	1.607	1.607	2.004	1.794	1.612	1.852	1.410	1.423	93.121	83.461	83.461
I.R.A. In. Reso. agudas	18.392	17.360	17.360	17.575	18.692	17.296	17.322	18.864	17.381	17.431	17.661	17.444	659.142	712.023	625.987
Gripe	1.006	1.156	1.202	1.111	1.202	1.260	1.176	1.317	1.317	1.101	1.221	1.528	55.777	75.823	75.823
Neumonía	70	72	60	70	101	71	46	66	60	78	74	57	3.195	3.735	3.394
Tuberculosis respiratoria	6	2	2	6	2	2	1	3	3	0	8	5	205	170	220
Sarampión	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	46	1.289	230
Rubéola	1	1	1	0	3	3	0	1	3	0	0	0	98	119	304
Varicela	58	57	57	44	87	67	62	64	64	84	78	78	13.387	7.371	8.851
Escarlatina	2	3	3	12	3	3	0	1	3	2	3	2	105	102	136
Brucelosis	0	2	1	2	1	1	0	1	1	3	1	2	94	71	71
Fiebre exantemática Medit.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	13	15
Sífilis	0	1	0	0	2	1	1	0	0	2	0	0	22	29	16
Infección gonocócica	0	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	23	45	50
Infección meningocócica	0	1	1	0	2	2	0	0	1	0	0	3	23	44	74
Hepatitis	2	4	4	0	3	2	0	0	4	0	4	4	104	213	283
Fiebre reumática	1	1	1	1	0	0	0	0	1	2	1	1	46	92	92
Parotiditis	2	0	3	1	0	3	2	0	3	3	0	1	77	51	104
Tosferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	28	38
Otras meningitis	6	1	1	7	0	2	3	1	1	3	1	1	56	116	112
Otras tuberculosis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	32	26
Otras E.T.S	14	18	20	21	22	24	12	15	16	20	14	14	668	849	833
Hidatidosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Carbunco	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1
Leishmaniasis	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	3	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3


Municipios	Población (Proyec. 1994)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1994)	% de declaración
Abanilla	5.586	100,0	Calasparra	8.649	100,0
Abarán	12.028	96,9	Campos del Río	1.892	100,0
Aguilas	26.119	100,0	Caravaca de la Cruz	20.509	100,0
Albudeite	1.346	100,0	Cartagena	167.447	68,6
Alcantarilla	32.165	98,5	Cehegín	12.803	77,5
Aledo	947	100,0	Ceutí	6.718	87,5
Alguazas	7.226	80,0	Cieza	31.265	100,0
Alhama de Murcia	14.380	89,3	Fortuna	5.945	85,0
Archena	13.773	72,5	Fuente Alamo de Murcia	7.982	93,8
Beniel	7.758	100,0	Jumilla	19.684	75,0
Blanca	5.595	100,0	Librilla	3.788	100,0
Bullas	9.953	100,0	Lorca	66.105	96,3

	Áreas de Salud												REGION	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Total	
Población <sup>1)</sup>	430.116		254.174		124.407		60.263		47.587		153.057		1.069.604	
	Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.	

Enfermedades:

Fiebre tifoidea y Paratif.	1	6	1	7	0	4	0	2	0	3	1	3	3	25
Disentería	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Toxi-Infec. alimentarias	13	222	23	130	4	196	1	7	0	33	3	35	44	623
Otros procesos diarreicos	3.440	36.008	1.086	19.026	1.262	11.869	455	7.228	928	6.715	953	12.275	8.124	93.121
I.R.A. In. Resp. agudas	27.630	251.847	12.086	121.091	10.482	95.484	5.770	55.244	4.685	41.271	10.067	94.205	70.720	659.142
Gripe	2.133	21.342	374	8.997	887	11.946	159	4.329	199	1.947	642	7.216	4.394	55.777
Neumonía	102	1.206	37	540	56	533	11	181	11	240	47	495	264	3.195
Tuberculosis respiratoria	6	73	2	72	0	8	1	7	0	7	4	38	13	205
Sarampión	2	31	0	6	0	2	0	1	0	0	1	6	3	46
Rubéola	1	41	0	18	0	10	0	5	0	0	0	24	1	98
Varicela	67	6.515	41	2.082	35	2.059	7	940	86	223	12	1.568	248	13.387
Escarlatina	14	65	0	10	0	1	2	12	0	2	0	15	16	105
Brucelosis	2	21	1	23	0	21	1	22	0	3	1	4	5	94
Fiebre exantemática Medit.	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Sífilis	0	5	3	12	0	0	0	0	0	1	0	4	3	22
Infec. gonocócica	1	10	3	9	0	1	0	1	0	0	0	2	4	23
Infec. meningocócica	0	9	0	7	0	2	0	0	0	0	0	5	0	23
Hepatitis	1	49	1	36	0	8	0	7	0	2	0	2	2	104
Fiebre reumática	4	32	0	4	0	3	0	1	0	0	0	6	4	46
Parotiditis	5	25	1	16	1	9	0	7	0	0	1	20	8	77
Tosferina	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8
Otras meningitis	13	29	3	19	0	1	0	2	2	4	1	1	19	56
Otras tuberculosis	0	16	1	7	0	0	0	0	0	0	0	2	1	25
Otras E.T.S.	9	156	19	158	5	57	0	18	7	54	27	225	67	668
Hidatidosis	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Carbunco	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
Leishmaniasis	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	2	4
Tétanos	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Arqui	5.368	100,0	Torre Pacheco	17.187	100,0
Azarrón	15.502	97,7	Torres de Cotillas. Las	14.945	96,9
Bañeza de Segura	39.598	69,6	Totana	20.941	96,2
Castalla	8.349	80,6	Ulea	1.044	100,0
Castell	13.051	88,6	Unión, La	13.519	100,0
Cartagena	343.494	77,3	Villanueva del Río Segura	1.623	50,0
Castell	694	75,0	Yecla	27.903	100,0
Castell	3.266	75,0	Santomera	8.976	100,0
Cerro Lumbreras...	10.295	100,0	Alcázares, Los	4.292	100,0
Corte	1.649	100,0			
San Javier	15.455	95,0	Total Región	1.069.604	84,8
San Pedro del Pinatar	12.790	94,4			



### Indicador mortalidad

Solamente se consideran los fallecidos en los que el consumo de opiáceos o cocaína ha sido la causa fundamental de la muerte.

El número de fallecidos en los municipios monitorizados (Murcia y Cartagena) ha sido de 17

casos. La edad media ha sido de 28.2 años. Por sexo, el 100% de los casos ha ocurrido en hombres. En el 53% el municipio de defunción fue Murcia y en el 47% Cartagena. El lugar de procedencia, donde se ha encontrado al fallecido, en el 35% ha sido en la calle, en el 30% han fallecido en el hospital, un 23%

AÑO	MURCIA	CARTAGENA	TOTAL
1990	5	5	10
1991	14	4	18
1992	9	7	16
1993	6	2	8
1994	9	8	17
1990-94	43	26	69

en su domicilio y en el 12% en otros lugares.

En el 100% de los casos existían antecedentes de consumo de drogas, por familiares, presencia de droga o de utensilios en el lugar de defunción, etc. En todos los casos al realizarle la autopsia, se encontraron hallazgos compatibles con muerte por drogas, como congestión visceral, edema agudo de pulmón, etc. En ningún caso se encontró autopsia blanca.

Los resultados toxicológicos en sangre muestran que en el 65% de los casos se han encontrado heroína/morfina o algún metabolito, en el 50% se ha encontrado alcohol, en el 41% se ha encontrado metabolitos de la cocaína, también en ese porcentaje benzodiazepinas y en el 23% metadona; éstas son las sustancias encontradas en la toxicología como más abundantes.

### Bibliografía

- (1) Población admitida a tratamiento por opiáceos o cocaína en la Región de Murcia en 1993. Boletín Epidemiológico de Murcia 1994, 15: 25-30.
- (2) Sistema de Información sobre Toxicomanías en la C.A. de Murcia (SITCAM). Informe año 1994. Servicio de Epidemiología. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Murcia 1995 (documento mimeografiado).
- (3) Proyecciones de la población de derecho de la Región de Murcia y sus áreas de salud. Periodo, 1986-2000. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud y Consumo. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Murcia 1995. (en imprenta).
- (4) Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías (SEIT). Informe año 1993. Ministerio de Justicia e Interior. Madrid 1994.

**Juan Fco. Correa Rodríguez**  
SITCAM. Servicio de Epidemiología  
Comisionado para la Droga.  
Dirección General de Salud y Consumo  
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales