

Indicadores  
de Salud de la  
Región de Murcia:  
actualización 1994

**Avances en mortalidad**

En la Región de Murcia, de 1989 a 1990, la mortalidad general se mantiene (9,47 y 9,56 defunciones por 1.000 respectivamente, tasas estandarizadas a la población española de 1989). Aunque la tasa disminuye

en 1991 (8,65), sigue siendo mayor que la de España en 1990 (8,39).

En 1990, el exceso de mortalidad general observado en Murcia se debe principalmente a las enfermedades del aparato circulatorio y, en parte, a las enfermedades del aparato respiratorio (tabla 1).

La mortalidad infantil en Murcia se mantiene próxima a la de España, como se puede observar en la gráfica 1, con una cota mínima de 6,5 fallecidos por mil nacidos vivos en 1990.

Murcia tiene una esperanza de vida al nacer de 77,1 años, que es equiparable a Asturias o Cataluña, o países como Holanda,

y es superior a la de EE.UU. o de la CEE en 1990 (tabla 2).

**Sistema de información sanitaria sobre enfermedades de declaración obligatoria (SISEDO) en 1993.**

La tabla 3 muestra los datos para 1993 de las EDO cuya erradicación en la Región Europea es uno de los objetivos de la OMS para el año 2000. La tabla 4 muestra los datos para 1993 de las EDO cuya disminución en la Región Europea es uno de los objetivos de la OMS para el año 2000.

Durante 1993 se registraron un total de 68 brotes epidémicos en la Región. En la tabla 5 se relacionan los brotes investigados y el número de afectados. La información detallada sobre los brotes de infecciones e intoxicaciones alimentarias ha sido publicada en el Boletín Epidemiológico nº 533.

Tabla 1. Mortalidad por grandes causas en España y Murcia, ambos sexos, 1990. Tasas estandarizadas por 100.000 hab. a la población española de 1990 (cifras redondeadas)

GRANDES GRUPOS DE CAUSAS	REGION DE MURCIA	ESPAÑA
Enf. infecciosas y parasitarias	10,7	10,0
Tumores	199,2	204,3
Enf. endocrinas e inmunidad	31,1	31,7
Enf. de la sangre	3,4	3,2
Trastornos mentales	13,9	14,0
Enf. del sistema nervioso	12,4	11,9
Enf. del aparato circulatorio	424,2	348,0
Enf. del aparato respiratorio	10,5	83,0
Enf. del aparato digestivo	55,0	48,4
Enf. del aparato genitourinario	23,2	18,5
Enf. de la maternidad	0,0	0,1
Enf. de la piel	1,3	1,4
Enf. del sistema osteomuscular	8,6	7,1
Anomalías congénitas	3,5	3,6
Afecciones perinatales	2,6	3,5
Mal definidas	23,8	18,1
Traumatismos y envenenamientos	52,2	48,4

**Registro de SIDA**

El número de casos confirmados de SIDA, según la definición de los CDC de 1987, que se han registrado en la Región de Murcia desde 1984 hasta el 31 de diciembre de 1993 es 334 (Informe nº 1 de 1994 del Registro Regional de casos de SIDA).

**Incidencia de cáncer en la Región de Murcia en 1989**

En 1989 se han registrado 3.370 casos nuevos de cáncer en la Región, excluidos los carcinomas "in situ". Un 56,7% corresponden a hombres y el 43,3% a mujeres, distribución bastante semejante a la del período 1986-88 (58,6% en hombres y 41,4% en mujeres).

\* Datos de las Defunciones secundarias registradas en 1990. Instituto Nacional de Estadística. Boletín Epidemiológico nº 533.

*Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 49 a 52 (del 5 de diciembre de 1993 al 1 de enero de 1994). Distribución semanal*

Enfermedades	Casos notificados												Casos acumulados		
	Semana 49			Semana 50			Semana 51			Semana 52			Semanas 01 a 52		
	1993	1992	Mediana	1993	1992	Mediana	1993	1992	Mediana	1993	1992	Mediana	1993	1992	Mediana
Enfermedades															
Fiebre tifoidea	0	5	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	17	49	55
Disenteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
Toxi-Infec. alimentaria	2	10	5	0	1	3	2	4	1	3	0	5	535	721	775
Procesos diarreicos	1.187	1.773	1.597	1.541	1.552	1.710	1.345	1.668	1.668	1.103	1.331	1.519	82.013	99.515	92.403
I.R.A. In. Resp. aguda	14.870	17.213	16.495	19.252	14.646	16.290	18.052	17.714	17.714	15.917	13.903	14.694	726.788	743.604	675.138
Gripe	1.628	1.084	1.512	3.082	1.281	2.414	5.130	1.400	2.393	7.448	1.350	5.591	87.855	66.883	116.310
Neumonía	54	41	51	78	51	74	71	62	60	77	50	71	3.709	3.598	3.343
Tuberculosis respiratoria	3	11	5	8	3	3	3	1	4	1	5	3	185	240	242
Sarampión	1	66	0	2	19	1	0	13	1	0	16	0	1.244	344	84
Rubéola	0	4	4	1	0	0	0	0	1	1	2	2	112	67	481
Varicela	77	165	66	80	161	109	71	195	76	58	129	88	7.165	8.730	12.609
Escarlatina	2	8	5	0	4	2	1	2	2	0	2	2	95	178	161
Carbunco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1
Brucelosis	0	1	0	2	2	1	3	0	0	1	0	0	72	71	80
Fiebre Exant. Mediterránea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8	16
Sífilis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	31	17
Infección gonocócica	1	2	1	1	1	1	1	2	1	0	0	1	44	56	56
Infección meningocócica	0	5	2	0	4	2	0	2	2	0	3	2	45	88	92
Hepatitis	4	5	4	4	3	3	4	1	1	0	3	2	205	350	301
Fiebre reumática	0	2	2	0	3	1	0	2	2	0	2	4	97	70	121
Parotiditis	0	0	2	0	0	2	0	1	2	0	3	3	47	85	267
Tosferina	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	87	82
Leishmaniasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2
Tétanos	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	2	2
Cólera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Otras meningitis	1	27	0	0	22	1	0	20	2	2	17	2	115	221	115
Otras tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	27	26
Otras E.T.S.	4	8	8	9	11	11	8	21	17	8	20	10	744	893	893

\* mediana de cada año sobre el último quinquenio. NO se incluyen las enfermedades sin casos notificados en año actual: Murcia, 1993.

*Porcentaje de declaración\* (resultados provisionales). Semanas 49 a 52 (del 5 de diciembre de 1993 al 1 de enero de 1994)*

Municipios	Población (Padrón 1991)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1991)	% de declaración
Abanilla	6.074	60,0	Calasparra	8.745	100,0
Abarán	11.865	100,0	Campos del Río	1.949	75,0
Aguilas	24.894	90,6	Caravaca de la Cruz	21.296	100,0
Albudeite	1.411	87,5	Cartagena	168.023	63,0
Alcantarilla	30.144	96,8	Cehegín	13.614	80,0
Aledo	985	100,0	Ceutí	6.411	58,3
Alguazas	6.931	80,0	Cieza	30.875	98,7
Alhama de Murcia	14.175	100,0	Fortuna	6.004	85,0
Archena	13.487	82,5	Fuente Alamo de Murcia	8.279	87,5
Beniel	7.220	100,0	Jumilla	20.092	42,3
Blanca	5.768	100,0	Librilla	3.764	100,0
Bullas	10.009	100,0	Lorca	65.919	82,9

\* num. partes de declaración numerica recibidas / (num. de médicos de atención primaria x población) x 100. Murcia, 1993.


*Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 49 a 52 (del 5 dic. de 1993 al 1 enero de 1994). Casos notificados*

Enfermedades	Áreas de Salud												REGION	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Total	
	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	
Población <sup>(1)</sup>	411.661		251.837		122.225		62.640		47.454		149.784		1.045.601	
Fiebre tifoidea	0	3	0	7	0	1	0	2	0	2	0	2	0	17
Disenteria	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Toxi-Infec. alimentaria	4	191	1	69	0	12	0	29	0	29	2	205	7	535
Procesos diarreicos	1.912	30.242	1.105	16.849	613	10.406	368	6.621	358	5.981	820	11.914	5.176	82.013
I.R.A. In. Resp. aguda	24.138	252.926	14.742	151.956	9.484	99.946	6.292	67.271	3.447	48.326	9.988	106.363	68.091	726.788
Gripe	6.415	30.359	3.557	19.558	2.183	13.599	1.184	7.412	856	4.294	3.093	12.633	17.288	87.855
Neumonía	103	1.319	58	827	42	433	15	273	20	345	42	512	280	3.709
Tuberculosis Resp.	7	67	6	67	2	10	0	4	0	6	0	31	15	185
Sarampión	3	482	0	81	0	16	0	69	0	36	0	560	3	1.244
Rubéola	2	68	0	12	0	1	0	3	0	14	0	14	2	112
Varicela	91	3.107	42	1.092	70	682	14	273	11	988	58	1.023	286	7.165
Escarlatina	2	42	1	26	0	5	0	11	0	0	0	11	3	95
Carbunco	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Brucelosis	2	9	2	24	0	14	2	14	0	0	0	11	6	72
Fiebre Exant. Mediterránea	0	0	0	7	0	4	0	0	0	0	0	1	0	12
Sífilis	0	4	0	14	0	2	0	0	0	1	0	3	0	24
Infec. gonocócica	2	12	0	23	1	5	0	2	0	0	0	2	3	44
Infec. meningocócica	0	9	0	21	0	4	0	4	0	0	0	7	0	45
Hepatitis	9	142	1	34	1	7	0	3	0	2	1	17	12	205
Fiebre reumática	0	51	0	16	0	10	0	20	0	0	0	0	0	97
Parotiditis	0	21	0	9	0	3	0	5	0	1	0	8	0	47
Tosferina	0	3	0	2	0	18	0	2	0	2	0	0	0	27
Leishmaniasis	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Paludismo	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4
Tétanos	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4
Cólera	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Otras meningitis	1	57	1	34	0	4	0	4	0	1	1	15	3	115
Otras tuberculosis	0	8	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15
Otras E.T.S.	5	249	14	213	5	126	1	28	0	26	4	102	29	744

*1. Censo 1991. No se incluyen las enfermedades sin casos notificados durante el año actual. Murcia, 1994*

Municipios	Población (Padrón 1991)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1991)	% de declaración
Lorquí	5.328	100,0	Santomera	8.518	100,0
Mazarrón	14.591	100,0	Torre Pacheco	16.568	100,0
Molina de Segura	37.806	63,0	Torres de Cotillas, Las	14.132	90,6
Moratalla	8.976	75,0	Totana	20.466	100,0
Mula	13.053	90,9	Ulea	1.073	100,0
Murcia	328.100	53,5	Unión, La	13.940	100,0
Ojós	678	100,0	Villanueva del Río Segura	1.663	100,0
Pliego	3.327	66,7	Yecla	27.362	95,3
Puerto Lumbreras	9.961	100,0	Alcázares, Los	3.683	100,0
Ricote	1.689	75,0			
San Javier	14.696	100,0	Total Región	1.045.601	75,2
San Pedro del Pinatar	12.057	100,0			

Gráfica 1. Comparación de la mortalidad infantil en la Región de Murcia y España, 1975-91



fuente: INE, 1987-90. Datos provisionales 1991


La tasa de incidencia ajustada por edad, tomando como estándar la población mundial, fue de 245,2 por cien mil hombres y 153,6 por cien mil mujeres. Esta cifra excluye los tumores de la piel no melanocíticos, en los que se asume la existencia de subregistro y, por tanto, sus cifras son de difícil interpretación. Al comparar con el período 1986-88 se observa un aumento cercano al 2% en los hombres y del 6% en las mujeres. Este mayor incremento de la incidencia en las mujeres se corresponde con una reducción del 70% al 50%

Tabla 2. Esperanza de vida al nacer (en años)

ESTADO / CC.AA.	AÑO	AMBOS SEXOS	HOMBRES	MUJERES
Región de Murcia	1991	77,13	73,95	80,29
Asturias	1991	76,7	72,8	80,7
Cataluña	1990	77,29	73,76	80,79
España	1990	76,94	73,40	80,49
EE.UU.	1991	-	72,80	79,90
Suecia	1990	-	74,37	80,22
Suiza	1990	-	74,10	80,90
C.E.E.	1990	-	72,8	79,4
Holanda	1990	-	73,8	80,1

fuente: INE, "Factores de mortalidad de la población española, 1990-91" Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 1993  
 World Health Statistics Annual, World Health Organization, Ginebra, 1993  
 Datos no disponibles

Gráfica 2. Incidencia de cáncer. Región de Murcia, 1989. Distribución de casos por localización y sexo



te aumento puede ser atribuido, al menos de forma importante, a una mejora en la exhaustividad del registro para esta localización. En los hombres lo más relevante, además, es que continúa la tendencia descendente en el cáncer de estómago y ascendente en el cáncer de próstata, colon y recto. En las mujeres continúa aumentando el cáncer de mama. También aumenta el cáncer de colon, sistema hematopoyético y de ovario.

**Tabla 3. Enfermedades de declaración obligatoria cuya erradicación en la Región Europea es uno de los objetivos de la OMS para el año 2000**

Región de Murcia y España. Año 1993. Casos y tasas por 100.000 hab.

ENFERMEDAD (*)	REGION DE MURCIA		ESPAÑA	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Sarampión	1.292	121,7	11.977	30,6
Difteria	0	0,0	0	0,0
Paludismo (**)	4	0,4	194	0,5
Poliomielitis	0	0,0	0	0,0

Fuente: Registro de Enfermedades de Sanidad Pública. Centros Sociales de Murcia. Ministerio de Sanidad y Consumo.  
 (\*) Las enfermedades tuberculosa, sifilítica y sífilis congénita también son objeto de erradicación a largo plazo, pero únicamente por su inclusión en la nomenclación de estas "enfermedades de declaración obligatoria". Tuberculosis y sífilis son de declaración general.  
 (\*\*) Casos importados de otros países.

**Tabla 4. Enfermedades de declaración obligatoria cuya disminución en la Región Europea es uno de los objetivos de la OMS para el año 2000**

Región de Murcia y España. Año 1993. Casos y tasas por 100.000 hab.

ENFERMEDAD (*)	REGION DE MURCIA		ESPAÑA	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Tuberculosis respiratoria	182	17,1	9.441	24,1
Otras tuberculosis	32	3,0	(-)	(-)
Hepatitis vírica	223	21,0	12.642	32,3
Tosferina	28	2,6	6.227	15,9
Sífilis	29	2,7	1.196	3,1
Infección gonocócica	48	4,5	7.272	18,6
Otras ETS	878	82,7	(-)	(-)

Fuente: Registro de Enfermedades de Sanidad Pública. Centros Sociales de Murcia. Ministerio de Sanidad y Consumo.  
 (\*) Las enfermedades de declaración obligatoria de declaración general.

**Tabla 5. Brotes epidémicos registrados. Región de Murcia 1993**

Enfermedad	Núm. Brotes	Núm. Afectados
Infección/intoxicación alimentaria	34	220
Sarampión	23 (*)	1.174
Hepatitis A	3	48
Gastroenteritis inespecífica	2	150
Rubéola	2	26
Gripe por virus		
Influenza B	1	37
Meningitis aséptica	1	9
Carbunco	1	3
Tosferina-like	1	15
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>1.682</b>

Fuente: Registro de Vigilancia Epidemiológica. Servicio de Epidemiología. Centro de Salud de Murcia. Año 1993.  
 (\*) Número de casos superando los 100 afectados.

**Tabla 6. Incidencia de cáncer en la Región de Murcia: número de casos y tasas de incidencia anual de cáncer por cien mil hab., ajustadas a la población mundial. Principales localizaciones por sexo. 1986-88 y 1989**

HOMBRES	1989			1986-88			MUJERES	1989			1986-88		
	Localización	Casos	Tasa	Tasa	Localización	Casos		Tasa	Tasa	Localización	Casos	Tasa	Tasa
Piel	368	55,7	50,6	Piel	349	40,8	28,9						
Tráquea, bronquios y pulmón	303	47,1	48,0	Mama	286	42,8	41,4						
Vejiga urinaria	177	25,9	26,6	Colon	93	11,2	10,4						
Glándula prostática	153	21,7	18,4	Cuerpo útero	70	9,9	10,2						
Estómago	107	16,2	17,5	Estómago	70	8,0	8,2						
Laringe	105	17,6	16,0	Recto	66	7,8	7,6						
Colon	91	13,2	12,4	Sist. Hematopoy.	61	8,4	6,4						
Recto	81	12,5	11,0	Ovario	52	8,0	6,4						
Labio	65	10,6	12,3	Cuello útero	45	6,8	7,1						
Sist. Hematopoy. y Retic.	53	9,3	10,5	Vesícula biliar	36	4,1	3,7						
Todas las localizaciones	1.911	297,9	289,3	Todas las localizaciones	1.459	191,5	170,6						
Todas excepto piel	1.560	245,2	240,7	Todas excepto piel	1.131	153,6	144,6						

Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología.

**Sistema de información sobre toxicomanías (SITCAM) en 1992**


En la Región de Murcia, de los 842 pacientes que iniciaron tratamiento por opiáceos o cocaína durante el año 1992, 417 lo hicieron por primera vez. Es a este grupo al que nos referimos seguidamente. La distribución por centro de tratamiento se presenta en la *gráfica 3*.

Los primeros inicios de tratamiento han experimentado un incremento del 9% respecto al año 1991. Según el tipo de droga por la que se demanda tratamiento, el 91,8% lo hizo por la heroína y el 7,6% por la cocaína. La vía de administración de la droga principal se mantiene, en primer lugar, la inyectada (60,9%), si bien ha existido un descenso del 17% respecto del año 1991. Por el contrario ha aumentado la vía inhalada y, sobre todo, la fumada (*gráfica 4*). Información más detallada se puede encontrar en el **Bol. Epidemiol. Murcia 1993; 14:85-90**.


Los porcentajes de otras drogas consumidas en los últimos 30 días antes del inicio del primer tratamiento por heroína, respecto del año 1991, han descendido para la mayoría de las drogas (*gráfica 5*). El 60% de los pacientes que demandan primer tratamiento son consumidores de heroína y cocaína, porcentaje que ha descendido respecto a 1991.

El 6,4% de los pacientes han iniciado el consumo de la droga principal cuando tenían una edad menor de 15 años y el 30,3% antes de cumplir los 18 años.


*Gráfica 3. Distribución por centros de los casos de primer tratamiento por opiáceos en la Región de Murcia en el año 91-92*



*Gráfica 4. Vía de administración de la droga principal en los pacientes que han realizado primer tratamiento. Región de Murcia. Año 1992*



*Gráfica 5. Porcentaje de otras drogas consumidas en los 30 días anteriores, al iniciar primer tratamiento por heroína en el periodo 1991-1992. Región de Murcia*



Fuente: SITCAM. Servicio de Epidemiología.

**Suscripción: Envío gratuito, siempre que sea dirigido a cargo oficial. Solicitudes: Servicio de EPIDEMIOLOGIA  
Dirección General de Salud y Consumo, Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales  
Ronda de Levante, 11. MURCIA 30008**