

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  
 Consejería de Sanidad y Seguridad Social  
 Dirección Regional de Salud  
 Sección de Epidemiología

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA

Nº 220

INDICE :

- 1. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria
  - 1.1. Situación regional ..... 18
  - 1.2. Distribución por comarcas ..... 19
- 2. Estado de las enfermedades de baja incidencia ..... 20
- 3. Comentario Epidemiológico Regional : TETANOS ..... 20
- 4. FE DE ERRATA ..... 20

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN LA SEMANA 6 (del 6 al 12 de febrero de 1983)

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res.22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 6		Casos acumulados semana 6		mediana 1976-82		índice epidémico		Valoración de la inci- dencia.
		1983	1982	1983	1982	sem. 6	acumul.	sem. 6	acumul.	
Fiebre Tifoidea	002	5	4	17	31	2	4	2,5	4,3	ALTA
Disentería	004	0	3	2	4					
*Toxi-Infec.Alimentaria	003 y 005	0	4	11	23					
*Procesos Diarreicos	006-009	641	620	4.230	4.151					
*I.R.A. (infec.resp.agudas)	460-466	6.641	3.847	38.557	21.852					
Gripe	487	9.595	1.093	66.090	6.351	359	1.617	26,7	40,9	ALTA
*Neumonía	480-486	3	1	69	9					
Tuberc. Respiratoria	011 y 012	1	3	8	23					
Sarampión	055	942	30	5.486	125	30	125	31,4	43,9	ALTA
Rubeola	056	28	11	118	66					
Varicela	052	106	120	550	735	37	170	2,9	3,2	ALTA
Escarlatina	134.1	5	4	24	59	1	4	5,0	6,0	ALTA
Brucelosis	023	4	5	18	24	3	11	1,3	1,6	ALTA
*Sífilis	091-093	2	0	8	3					
*Infec. Gonocócica	098.0 y 098.1	16	13	73	65					
Infec. Meningocócica	036	11	5	42	19	4	26	2,8	1,6	ALTA
*Hepatitis	070	8	12	43	110					
*Parotiditis	072	54	43	282	271					
*Tos Ferina	033	10	193	160	648					

\* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana y el índice epidémico por ser de notificación posterior a 1976.

## 1.2. DISTRIBUCION COMARCAL DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (semana 6 de 1983)

19

Comarca		NOROESTE	ALTIPLANO	LORCA	CARTAGENA	MULA	ALCANTAR.	CIEZA	MOLINA	FORT/ABAN.	MURCIA CAP.
Población		61.821	45.970	110.866	238.201	21.820	41.265	47.996	76.636	26.327	284.585
Tasa 1 caso/100.000 h.		1,6	2,2	0,9	0,4	4,6	2,4	2,1	1,3	3,8	0,4
Fiebre	ca.	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0
Tifoidea	ac.	2	4	3	3	0	0	0	2	0	3
Procesos	ca.	23	30	11	316	3	15	19	60	9	155
Diarreicos	ac.	205	173	91	1.709	20	78	229	472	118	1.135
I.R.A.	ca.	265	413	460	1.207	20	396	661	1.564	274	1.381
(Inf.Resp.Ag.)	ac.	2.147	3.434	1.975	7.988	195	2.161	3.131	7.613	2.105	7.808
Gripe	ca.	1.397	667	1.346	1.518	389	525	428	869	156	2.300
	ac.	8.272	6.957	7.288	14.134	2.726	3.292	2.642	6.421	2.141	12.217
Neumonía	ca.	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
	ac.	0	2	8	14	1	8	1	8	13	14
Tuberculosis	ca.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Respiratoria	ac.	0	1	0	1	0	0	1	0	0	5
Sarampión	ca.	106	40	103	120	8	91	29	102	45	298
	ac.	1.211	247	297	531	54	611	167	534	209	1.625
Rubeola	ca.	0	0	5	7	0	0	1	3	0	12
	ac.	1	10	14	48	2	0	6	16	0	21
Varicela	ca.	5	1	5	12	0	4	3	0	46	30
	ac.	32	9	43	103	2	31	15	16	141	158
Brucelosis	ca.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	ac.	8	3	5	1	0	1	0	0	0	0
Sífilis	ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ac.	0	1	2	1	0	0	0	0	0	4
Infección	ca.	0	0	2	3	0	0	2	4	2	3
Gonocócica	ac.	11	5	8	12	2	3	7	11	7	7
Infección	ca.	2	1	0	4	0	0	0	0	0	4
Meningocócica	ac.	3	2	0	15	1	2	0	0	0	19
Hepatitis	ca.	1	2	0	2	0	0	0	1	1	1
	ac.	3	2	1	11	0	0	1	8	1	16
Parotiditis	ca.	6	3	8	15	1	5	3	4	6	3
	ac.	11	27	29	91	2	33	9	16	22	42
Tos Ferina	ca.	0	0	1	0	0	3	2	1	2	1
	ac.	2	4	7	16	2	24	10	14	16	65

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res.22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 6		Casos acumulados semana 6	
		1983	1982	1983	1982
Carbunco	022	0	0	0	0
Fiebre exantémica mediterránea	082.1	0	0	0	0
Fiebre reumática aguda	390-392	4	1	40	22
Leishmaniasis	085	0	0	0	0
Lepra	030	0	0	0	0
Paludismo	084	0	0	0	0
Poliomielitis	045	0	0	0	0
Tétanos	037 y 771.3	2	0	2	2

De las restantes no se ha recibido ninguna notificación.

3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL: TETANOS

La Ciudad Sanitaria V. Arrixaca notificó dos casos de Tétanos -1 en Lorca y otro en Murcia- en la semana actual.

Se trata en ambos casos de mujeres de edad avanzada -61 y 80 años-, no vacunadas previamente y en la encuesta epidemiológica se señala como posible puerta de entrada un absceso glándula un abceso glándula de incubación ha sido de 6 y 7 días.

La aparición de casos esporádicos de tétanos en nuestra región se ha señalado repetidamente y analizado en distintas publicaciones, instándose a la necesidad de vacunación, especialmente de los individuos adultos no vacunados en las campañas infantiles. Una vez más instamos a todos los sanitarios locales a utilizar todos los medios de educación sanitaria disponibles para lograr una cobertura más amplia en este grupo de población procurando llegar sobre todo a aquellos colectivos que por sus condiciones socio-culturales, de ambiente rural muy aislado, edad, etc, suelen quedar más marginados de las campañas de vacunación.

4. FE DE ERRATA

En el boletín correspondiente a la semana 5 de 1983) apareció un error en la página 14, en la relación con la Fiebre Tifoidea : en el índice epidémico figuraba 0 y en realidad /

no se podía calcular por ser cero la mediana del septenio. En consecuencia la valoración de la incidencia no era "baja", sino que debía figurar en blanco.