

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  
 Consejería de Sanidad y Seguridad Social  
 Dirección Regional de Salud  
 Sección de Epidemiología

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA

Nº 190

INDICE : 1. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria

1.1. Situación regional ..... 68

1.2. Distribución por comarcas ..... 69

2. Estado de las enfermedades de baja incidencia ..... 70

3. Comentario Epidemiológico regional ..... 70

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN LA SEMANA 28 (del 11 al 17 de julio de 1982)

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res.22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 28		Casos acumulados semana 28		mediana 1975-81		índice epidémico		Valoración de la inci- dencia.
		1982	1981	1982	1981	sem. 28	acumul.	sem. 28	acumul.	
Fiebre Tifoidea	002	6	3	154	101	2	27	3,0	5,7	ALTA
Disentería	004	16	3	93	39					
*Toxi-Infec. Alimentaria	003 y 005	1	0	210	200					
*Procesos diarreicos	006-009	1.072	1.032	24.498	9.830					
*IRA (infec.resp.agudas)	460-466	1 665	1.742	83.231	24.418					
Gripe	487	192	164	24.824	53.479	13	6.089	14,8	4,1	ALTA
*Neumonía	480-486	2	-	109	-					
Tuberc. Respiratoria	011 y 042	1	3	87	96					
Sarampión	055	213	116	5.359	1.530	79	2.355	2,7	2,3	ALTA
Rubeola	056	31	35	1.302	796					
Varicela	052	119	468	6.988	9.654	86	1.247	1,4	5,6	ALTA
Escarlatina	134.1	7	4	295	151	1	73	7,0	4,0	ALTA
Brucelosis	023	11	9	139	180	2	65	5,5	2,1	ALTA
*Sífilis	091-093	0	1	35	8					
*Infec. Gonocócica	098.0 y 098.1	12	18	433	158					
Infec. Meningocócica	036	2	1	76	120	1	99	2,0	0,8	ALTA
*Hepatitis	070	13	20	610	254					
*Parotiditis	072	36	266	1.808	3.094					
*Tos Ferina	033	121	133	3.231	804					

\* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana y el índice epidémico por ser de notificación posterior a 1.975.

## 1.2. DISTRIBUCION COMARCAL DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (semana 28 -1982-)

69

POBLACION		N.ROESTE 65.044	ALTIPLANO 46.276	LORCA 165.512	CARTAGENA 238.151	MULA 23.064	ALCANTAR. 41.501	CIEZA 49.311	MOLINA 76.780	FORT/ABAN. 27.400	MURCIA CAP. 288.465
Tasa de 1 caso x 100.000 hab.		1,55	2,2	0,6	0,42	4,39	2,44	2,05	1,33	3,71	0,35
Fiebre ca.		0	0	0	12	0	0	3	0	0	1
Tifoidea ac.		6	10	2	61	1	1	4	13	2	54
Brucelosis ca.		5	1	0	0	0	0	0	0	1	4
ac.		26	16	30	23	5	1	2	14	3	19
Infección ca.		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Meningocóc. ac.		3	3	2	27	0	2	2	13	0	24
Varicela ca.		2	10	20	37	2	0	0	11	2	35
ac.		363	310	1.082	2.004	48	77	151	375	217	2.361
Sarampión ca.		12	6	11	89	4	13	3	38	9	28
ac.		248	9	387	225	79	312	55	834	127	1.053
Gripe ca.		0	8	39	67	0	0	15	51	0	12
ac.		418	973	3.321	4.193	186	1.020	1.361	3.622	388	9.342
Tuberculos. ca.		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Pulmonar ac.		6	2	7	20	2	3	3	9	0	35
Parotiditis ca.		1	0	2	17	2	11	0	1	0	2
ac.		16	48	239	251	9	133	0	629	44	439
Tos Ferina ca.		0	22	26	18	3	5	0	11	8	0
ac.		1	212	334	486	11	38	6	358	111	1.674
Hepatitis ca.		0	2	0	4	1	0	0	0	0	6
ac.		13	22	17	122	58	11	6	61	9	291
Rubeola ca.		1	0	1	19	2	0	0	3	1	4
ac.		44	9	83	551	17	10	20	127	46	395
Fiebre ca.		3	0	0	0	0	1	0	1	3	0
Reumática A. ac.		3	5	9	2	0	2	2	13	27	33
Tétanos ca.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ac.		0	0	0	0	0	0	2	1	0	2
Neumonía ca.		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
ac.		15	0	3	43	0	1	0	15	5	27
Gonococia ca.		0	0	0	3	0	0	3	0	0	6
ac.		5	5	29	62	5	30	52	64	12	169
Sfilis ca.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ac.		0	0	2	1	0	0	4	2	0	26

## 2. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA DE BAJA INCIDENCIA (±)

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res. 22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 28		Casos acumulados	
		1982	1981	1982	1981
Carbunco	022	0	0	0	0
Fiebre exantemática mediterránea	082.1	0	0	1	0
Fiebre reumática aguda	390-392	8	13	96	125
Leishmaniasis	085	0	0	2	0
Lepra	030	0	0	0	4
Paludismo	084	0	0	0	2
Poliomielitis	045	0	0	0	1
Tétanos	037 y 771.3	0	0	5	4

± De las restantes no se ha recibido ninguna notificación

## 3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGIA REGIONAL : PAROTIDITIS

En esta semana se han declarado 36 casos de parotiditis, siendo 1.808 los acumulados desde que comenzó el año. Para igual período de 1.981 las cifras fueron de 266 y 3.094, respectivamente.

Puesto que esta enfermedad -aunque no de manera tan regular como el sarampión u otras enfermedades de la infancia- tiene/ una distribución estacional, con mayor incidencia en invierno y primavera, es más útil comparar años epidemiológicos. Así, vemos que las diferencias no son importantes, pues se notificaron 3.246 en el año 1980-81 y 2.722 en 1981-82, aunque hay que tener en cuenta que la declaración ha sido a partir de mayo de 1981 cuando se ha mejorado.