



CÁNCER DE COLON Y RECTO. ¿HACEMOS BIEN LAS COSAS QUE HAY QUE HACER?



**JE Calle Urrea *, P Parra Hidalgo, C López Rojo,
C Arellano Morata, MP López Acuña, T Ramón
Esparza**

**Subdirección General de Calidad Asistencial.
Consejería de Sanidad y Política Social de
Murcia**



- **Evaluar la calidad de la atención al cáncer de colon y recto en los 9 hospitales públicos generales del Servicio Murciano de Salud**

- **10 indicadores a partir de la Estrategia de Cáncer del Ministerio de Sanidad**
- **Unidades de estudio:**
 - **Indicadores de estructura:** protocolos, documentos constitutivos y/o actas de los comités, cuestionario de situación de los hospitales y entrevistas realizadas a referentes en los mismos en **2011**
 - **Indicadores de proceso y resultado:** pacientes dadas de alta en **2009** por cáncer de colon y recto, excluyendo los carcinomas in situ y las recidivas
- **30 casos aleatorios por hospital (247 casos en total, 409 HHCC)**



TABLA: INDICADORES

<u>INDICADOR DE ESTRUCTURA</u>	<u>VALOR</u>
EXISTENCIA DE COMITÉ DE CÁNCER DE COLORECTAL Y DE PROTOCOLO COMPLETO	NO EXISTÍA PROTOCOLO COMPLETO EN NINGUNO Y MAS DEL 50% NO TENÍA COMITÉ

<u>INDICADORES DE PROCESO Y RESULTADO</u>	<u>VALOR IC 95%</u>	<u>ESTÁNDAR</u>	<u>RAZÓN DE VARIACIÓN</u>
PACIENTES EVALUADAS POR COMITÉ DE COLON Y RECTO	18,7 (13,8-23,5)	100	0-60%
NIVELES DE AG. CARCINOMA EMBRIONARIO EN LA HISTORIA CLÍNICA	80,7 (75,8-85,6)	90	1,25
INFORMES DE ANATOMÍA PATOLÓGICA CON CONTENIDOS REQUERIDOS INTERNACIONALMENTE	79,3 (74,1-84,4)	100	9,02
FALLO DE SUTURA EN CIRUGÍA ELECTIVA	6,2 (2,3-10,1) 12,9 (5,7-20,2)	<5 COLON <12 RECTO	4,00
INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA EN CIRUGÍA ELECTIVA	11,7 (7,5-15,8)	<10	9,00
INTERVALO DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO-TRATAMIENTO DE 30 DÍAS O MENOS	64,3 (58,9-71,6)	90	1,83

RESULTADOS

- **Alta variabilidad entre hospitales y alejamiento de los estándares en la mayor parte de indicadores, pero sobre todo en la evaluación por el Comité, el contenido adecuado del informe de anatomía patológica y el alto porcentaje de pacientes que sobrepasan el intervalo diagnóstico histopatológico-tratamiento recomendado**
- **Como primeras medidas correctoras se proponen la elaboración de un protocolo completo y la valoración de todos los casos por el Comité**

CONCLUSIONES